

CALENDÁRIO VACINAL

Crianças expostas ao HIV e pacientes que vivem com HIV/AIDS



NÚCLEO DE
IMUNIZAÇÕES

Bebês, Crianças e Adolescentes

CRIANÇA CONSIDERADA EXPOSTA⁹

Ao nascer	BCG ¹ Hepatite B	Dose única Dose inicial
2 meses	Pentavalente (DTP+Hib+ HB) Vacina poliomielite inativada (VIP) Vacina oral rotavírus humano ¹ Vacina pneumocócica 10	1ª Dose
3 meses	Meningocócica C	1ª Dose
4 meses	Pentavalente (DTP+Hib+ HB) Vacina poliomielite inativada (VIP) Vacina oral rotavírus humano ¹ Vacina pneumocócica 10	2ª Dose
5 meses	Meningocócica C	2ª Dose
6 meses	Pentavalente (DTP+Hib+ HB) Vacina poliomielite inativada (VIP) Vacina pneumocócica 10	3ª Dose
9 meses	Febre Amarela ¹	1ª Dose
12 meses	Vacina pneumocócica 10 ³ Meningocócica C ³ Tríplice viral ^{1,5} Varicela ^{1,5} Hepatite A	Reforço 1º Reforço 1ª Dose 1ª Dose
15 meses	Pentavalente (DTP+Hib+ HB) ² Vacina poliomielite inativada (VIP) ⁶ Tríplice viral ^{1,5} Varicela ^{1,5}	1º Reforço 1º Reforço 2ª Dose 2ª Dose
18 meses	Hepatite A	2ª Dose
24 meses	Vacina pneumocócica 23 (CRIE)	1ª dose
4 anos	Tríplice bacteriana (DTP) Vacina poliomielite inativada (VIP) Febre Amarela ¹	2º Reforço 2º Reforço Reforço

1 - Vacinas atenuadas somente serão administradas em pacientes imunocompetentes ou com liberação médica.

2 - Recomenda-se a realização de sorologia Anti -HBs 30 a 60 dias após o término do esquema. Se anti AGHBs <10 UI/mL, repetir esquema de 4 doses com vacina hepatite B monovalente, com o dobro da dose. Pessoas não vacinadas previamente, usar o esquema de 4 doses da vacina HB monovalente, com o dobro da dose conforme o laboratório produtor para a faixa etária.

3 - Criança acima de 12 meses com apenas 1 dose ou sem comprovação, realizar 2 doses com intervalo de 60 dias. Meningo C realizar um reforço a cada 5 anos se HIV+.

4 - Vacina Haemophilus influenzae tipo b (Hib) para maiores de 12 meses nunca vacinados.

5 anos	Vacina pneumocócica 13 ⁷ (CRIE)	1ª Dose
6 anos	Meningocócica C (CRIE)	2º Reforço (realizar reforço a cada 5 anos)
7 anos	Vacina pneumocócica 23 (CRIE)	2ª Dose
9 a 17 anos	Hepatite B ² Dupla Adulto (dT) HPV Meningocócica C (CRIE) Meningocócica ACWY (11 a 12) Vacinas pneumocócicas (CRIE) Hib ⁴ (CRIE) Febre Amarela ¹ Tríplice viral ¹ Varicela ¹ (CRIE) Hepatite A (CRIE)	4 doses (esquema 0, 1, 2 e 6 meses) 3 doses com intervalo de 60 dias (reforço a cada 10 anos) 3 doses (esquema 0, 2 e 6 meses) 2 doses com intervalo de 60 dias e reforço a cada 5 anos Dose única Dose única com pneumo 13 ⁷ . Após 8 semanas realizar 1ª dose de pneumo 23 e uma 2ª dose 5 anos após 2 doses com intervalo de 60 dias Reforço ou dose única ⁸ 2 doses com 30 dias de intervalo mínimo 2 doses com 30 dias de intervalo 2 doses com 6 meses de intervalo

Adultos

Acima de 18 anos	Hepatite B ² Dupla Adulto (dT) Febre Amarela ¹ Tríplice viral ¹ Hib ⁴ (CRIE) Varicela (CRIE) Hepatite A (CRIE) Vacinas pneumocócicas (CRIE) Meningocócica C (CRIE) HPV (até 45 anos de idade)	4 doses (esquema 0, 1, 2 e 6 meses) 3 doses com intervalo de 60 dias (reforço a cada 10 anos) Reforço ou dose única ⁸ 2 doses com 30 dias de intervalo mínimo 2 doses com intervalo de 60 dias 2 doses com 30 dias de intervalo 2 doses com 6 meses de intervalo Dose única com pneumo 13 ⁷ . Após 8 semanas realizar 1ª dose de pneumo 23 e uma 2ª dose 5 anos após 2 doses com intervalo de 60 dias e reforço a cada 5 anos 3 doses (esquema 0, 2 e 6 meses)
------------------	--	---


5 - Crianças expostas ao HIV ou HIV+ não devem receber Tetraviral por não se possuir dados de segurança nessa população.

6 - Contraindicado o uso de VOP a este público, mesmo após negativação, pois convivem com pessoa imunodeprimida.

7 - Caso não tenha recebido Pneumo 10 previamente.

8 - De acordo com a situação vacinal encontrada. Realizar reforço se tiver recebido somente uma dose antes dos 5 anos.

9 - Crianças expostas verticalmente ao HIV devem receber as vacinas indicadas nesse calendário até os 18 meses de idade. Após essa idade e excluída a infecção pelo HIV, devem seguir o esquema básico vacinal recomendado pelo PNI, à exceção da pólio (receberão inativada, VIP) durante todo esquema e reforços, e influenza anualmente, por conviverem com pessoas com imunodeficiência.



Atualização Novembro/2022