

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

2000

TABELA 1 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo mês, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

| | Total | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Total | 9.816 | 780 | 762 | 728 | 727 | 786 | 819 | 1.000 | 950 | 793 | 830 | 747 | 894 |
| Masc | 5.273 | 387 | 420 | 409 | 403 | 444 | 432 | 525 | 498 | 414 | 453 | 398 | 490 |
| Fem | 4.543 | 393 | 342 | 319 | 324 | 342 | 387 | 475 | 452 | 379 | 377 | 349 | 404 |
| I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 662 | 59 | 41 | 61 | 51 | 59 | 42 | 54 | 74 | 48 | 50 | 49 | 74 |
| Masc | 449 | 40 | 27 | 41 | 31 | 38 | 34 | 37 | 53 | 32 | 33 | 30 | 53 |
| Fem | 213 | 19 | 14 | 20 | 20 | 21 | 8 | 17 | 21 | 16 | 17 | 19 | 21 |
| II. Neoplasias (tumores) | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2.118 | 165 | 181 | 173 | 208 | 159 | 189 | 191 | 182 | 163 | 160 | 161 | 186 |
| Masc | 1.078 | 81 | 89 | 100 | 113 | 80 | 100 | 95 | 91 | 86 | 70 | 81 | 92 |
| Fem | 1.040 | 84 | 92 | 73 | 95 | 79 | 89 | 96 | 91 | 77 | 90 | 80 | 94 |
| III. Doenças do sangue, órgãos hematopoiéticos e transtornos imunitários | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 34 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| Masc | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Fem | 21 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| IV. Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 457 | 31 | 23 | 28 | 21 | 34 | 41 | 55 | 57 | 40 | 36 | 47 | 44 |
| Masc | 190 | 11 | 10 | 13 | 12 | 13 | 16 | 21 | 24 | 22 | 16 | 21 | 11 |
| Fem | 267 | 20 | 13 | 15 | 9 | 21 | 25 | 34 | 33 | 18 | 20 | 26 | 33 |
| V. Transtornos mentais e comportamentais | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 81 | 11 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 14 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Masc | 51 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Fem | 30 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| VI. Doenças do sistema nervoso | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 170 | 11 | 16 | 10 | 14 | 8 | 12 | 25 | 14 | 16 | 15 | 10 | 19 |
| Masc | 84 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 11 | 5 | 10 | 7 | 6 | 11 |
| Fem | 86 | 6 | 11 | 3 | 7 | 4 | 6 | 14 | 9 | 6 | 8 | 4 | 8 |
| VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| IX. Doenças do aparelho circulatório | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 3.250 | 241 | 262 | 214 | 221 | 263 | 276 | 337 | 325 | 279 | 303 | 239 | 290 |
| Masc | 1.521 | 97 | 119 | 103 | 104 | 128 | 120 | 166 | 153 | 116 | 153 | 115 | 147 |
| Fem | 1.729 | 144 | 143 | 111 | 117 | 135 | 156 | 171 | 172 | 163 | 150 | 124 | 143 |
| X. Doenças do aparelho respiratório | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1.040 | 62 | 63 | 69 | 69 | 76 | 95 | 129 | 127 | 95 | 95 | 79 | 81 |
| Masc | 544 | 18 | 40 | 33 | 41 | 51 | 53 | 67 | 60 | 46 | 48 | 44 | 43 |
| Fem | 496 | 44 | 23 | 36 | 28 | 25 | 42 | 62 | 67 | 49 | 47 | 35 | 38 |
| XI. Doenças do aparelho digestivo | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 498 | 41 | 37 | 41 | 39 | 48 | 47 | 51 | 46 | 28 | 49 | 36 | 35 |
| Masc | 315 | 24 | 27 | 26 | 25 | 31 | 32 | 33 | 26 | 15 | 37 | 17 | 22 |
| Fem | 183 | 17 | 10 | 15 | 14 | 17 | 15 | 18 | 20 | 13 | 12 | 19 | 13 |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

TABELA 1 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo mês, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

Conclusão

| | Total | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Masc | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fem | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. Doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 63 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 |
| Masc | 15 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | 3 | 1 | - |
| Fem | 48 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| XIV. Doenças do aparelho geniturinário | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 126 | 10 | 6 | 16 | 6 | 10 | 16 | 17 | 6 | 8 | 13 | 11 | 7 |
| Masc | 55 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 |
| Fem | 71 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 9 | 9 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 |
| XV. Gravidez, parto e puerpério | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 12 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Fem | 12 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 178 | 20 | 13 | 14 | 10 | 16 | 12 | 13 | 12 | 15 | 13 | 12 | 28 |
| Masc | 98 | 12 | 11 | 8 | 5 | 10 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 14 |
| Fem | 80 | 8 | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | 8 | 5 | 5 | 14 |
| XVII. Malformações congênicas, deformidades e anomalias cromossômicas | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 111 | 11 | 12 | 7 | 5 | 8 | 11 | 12 | 9 | 16 | 7 | 5 | 8 |
| Masc | 68 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 11 | 6 | 3 | 7 |
| Fem | 43 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| XVIII. Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 103 | 12 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 14 | 7 | 4 | 8 | 7 | 20 |
| Masc | 52 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 13 |
| Fem | 51 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 |
| XX. Causas externas de morbidade e mortalidade | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 903 | 93 | 88 | 71 | 60 | 83 | 56 | 75 | 75 | 69 | 64 | 75 | 94 |
| Masc | 734 | 72 | 71 | 57 | 51 | 74 | 43 | 62 | 59 | 59 | 52 | 63 | 71 |
| Fem | 169 | 21 | 17 | 14 | 9 | 9 | 13 | 13 | 16 | 10 | 12 | 12 | 23 |

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

| | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|---|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| Total | 9.816 | 349 | 59 | 26 | 53 | 125 | 466 | 578 | 817 | 1.181 | 1.697 | 2.192 | 2.272 | 1 |
| Masc | 5.273 | 201 | 31 | 13 | 28 | 105 | 365 | 407 | 536 | 744 | 999 | 1.083 | 760 | 1 |
| Fem | 4.543 | 148 | 28 | 13 | 25 | 20 | 101 | 171 | 281 | 437 | 698 | 1.109 | 1.512 | - |
| I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 662 | 15 | 11 | 3 | 4 | 5 | 104 | 179 | 140 | 74 | 50 | 41 | 36 | - |
| Masc | 449 | 9 | 6 | - | 2 | 2 | 70 | 138 | 108 | 51 | 34 | 15 | 14 | - |
| Fem | 213 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 34 | 41 | 32 | 23 | 16 | 26 | 22 | - |
| A08 Infecções intestinais virais, outras e as não especificadas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A09 Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 11 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
| Masc | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
| A15 Tuberculose respiratória com confirmação bacteriológica e histológica | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| Masc | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| A16 Tuberculose das vias respiratórias sem confirmação bacteriológica ou histológica | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 53 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 5 | 11 | 10 | 9 | 6 | 6 | - |
| Masc | 39 | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 | 6 | 3 | 5 | - |
| Fem | 14 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | - |
| A17 Tuberculose do sistema nervoso | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| A18 Tuberculose de outros órgãos | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| A19 Tuberculose miliar | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 13 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
| Masc | 9 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| Fem | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| A27 Leptospirose | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| Masc | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A35 Outros tipos de tétano | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| A39 Infecção meningocócica | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 6 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Masc | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

Continuação

| | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|--|-----------|----------|----------|-----|----------|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| A41 Outras septicemias | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 21 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 2 | 11 | - |
| Masc | 9 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 3 | - |
| Fem | 12 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 8 | - |
| A46 Erisipela | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Fem | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| A48 Outras doenças bacterianas não classificadas em outra parte | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| A49 Infecção bacteriana de local não especificado | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A52 Sífilis tardia | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| A53 Outras formas e as não especificadas da sífilis | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A81 Infecções por vírus atípico do sistema nervoso central | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| A86 Encefalite viral não especificada | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A87 Meningite viral | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| B00 Infecções pelo vírus do herpes [herpes simples] | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| B18 Hepatite viral crônica | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 79 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 19 | 21 | 15 | 16 | 3 | - |
| Masc | 54 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 18 | 16 | 8 | 5 | 3 | - |
| Fem | 25 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 7 | 11 | - | - |
| B 18.1 Hepatite Viral B Crônica | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | |
| Masc | | | | | | | | | | | | | | |
| Fem | | | | | | | | | | | | | | |
| B 18.2 Hepatite Viral C Crônica | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | |
| Masc | | | | | | | | | | | | | | |
| Fem | | | | | | | | | | | | | | |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

Continuação

| | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|---|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| B 18.9 Hepatite Viral Crônica Não Especificada | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | |
| Masc | | | | | | | | | | | | | | |
| Fem | | | | | | | | | | | | | | |
| B19 Hepatite viral não especificada | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| B20 Doença por HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 314 | 8 | 3 | 2 | - | 2 | 75 | 126 | 66 | 22 | 5 | 4 | 1 | - |
| Masc | 218 | 5 | 1 | - | - | 1 | 51 | 95 | 47 | 13 | 3 | 1 | 1 | - |
| Fem | 96 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 24 | 31 | 19 | 9 | 2 | 3 | - | - |
| B21 Doença por HIV resultando em neoplasias malignas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 16 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | - | - | - |
| Masc | 14 | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 2 | 1 | - | - | - |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| B22 Doença por HIV resultando em outras doenças especificadas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 43 | 1 | - | - | - | - | 5 | 16 | 16 | 3 | 1 | - | 1 | - |
| Masc | 30 | - | - | - | - | - | 3 | 14 | 10 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Fem | 13 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| B23 Doença por HIV resultando em outras doenças | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 6 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| Masc | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| B24 Doença por vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 37 | - | 1 | - | 1 | - | 12 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| Masc | 28 | - | 1 | - | 1 | - | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Fem | 9 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - |
| B25 Doença por citomegalovirus | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| B26 Caxumba | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| B45 Criptococose | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| B57 Doença de Chagas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | - |
| Masc | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| B67 Equinococose | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| B69 Cisticercose | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

Continuação

| | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|---|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| B82 Parasitose Intestinal não especificada | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| B86 Escabiose [sarna] | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| B87 Míiase | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| B90 Seqüelas de tuberculose | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - |
| Masc | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - |
| Fem | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| B94 Seqüelas de outras doenças infecciosas e parasitárias e não especificadas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| Masc | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| B96 Outros agentes bacterianos como causa de doenças classificadas em outro capítulo | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| B99 Doenças infecciosas, outras e as não especificadas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| II. Neoplasias (tumores) | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2.118 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 | 17 | 76 | 195 | 355 | 498 | 577 | 371 | - |
| Masc | 1.078 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 30 | 92 | 192 | 290 | 303 | 145 | - |
| Fem | 1.040 | 1 | - | 2 | 5 | 2 | 10 | 46 | 103 | 163 | 208 | 274 | 226 | - |
| C01 Neoplasia maligna da base da língua | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
| Masc | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| C02 Neoplasia maligna de outras partes e de partes não especificadas da língua | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - |
| Masc | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| C04 Neoplasia maligna do assoalho da boca | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| C05 Neoplasia maligna do palato | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| C06 Neoplasia maligna de outras partes e de partes não especificadas da boca | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 1 | 2 | - | - |
| Masc | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 1 | 2 | - | - |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

| Continuação | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|---|------------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| C07 Neoplasia maligna da glândula parótida | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| C08 Neoplasia maligna de outras glândulas salivares maiores e não especificadas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| C09 Neoplasia maligna da amígdala | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| C10 Neoplasia maligna da orofaringe | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Masc | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| C11 Neoplasia maligna da nasofaringe | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| C12 Neoplasia maligna do seio piriforme | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| C13 Neoplasia maligna da hipofaringe | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| C14 Neoplasia maligna de outras localizações e de localizações mal definidas do lábio, cavidade oral e faringe | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - |
| Masc | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| C15 Neoplasia maligna do esôfago | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 89 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 23 | 30 | 16 | 13 | - |
| Masc | 68 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 19 | 23 | 11 | 9 | - |
| Fem | 21 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 7 | 5 | 4 | - |
| C16 Neoplasia maligna do estômago | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 112 | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 15 | 23 | 36 | 22 | - |
| Masc | 63 | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 11 | 15 | 19 | 10 | - |
| Fem | 49 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 8 | 17 | 12 | - |
| C17 Neoplasia maligna do intestino delgado | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| C18 Neoplasia maligna do cólon | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 154 | - | - | - | - | - | - | 5 | 11 | 22 | 33 | 50 | 33 | - |
| Masc | 67 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 10 | 21 | 19 | 10 | - |
| Fem | 87 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 12 | 12 | 31 | 23 | - |
| C19 Neoplasia maligna da junção retossigmóide | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

Continuação

| | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|---|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| C20 Neoplasia maligna do reto | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 41 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 6 | 6 | 11 | 13 | - |
| Masc | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | - |
| Fem | 24 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | - |
| C21 Neoplasia maligna do ânus e do canal anal | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Fem | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
| C22 Neoplasia maligna do fígado e vias biliares intra-hepáticas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 19 | 22 | 20 | 11 | - |
| Masc | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 14 | 13 | 5 | - |
| Fem | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 8 | 7 | 6 | - |
| C23 Neoplasia maligna da vesícula biliar | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | - |
| Masc | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Fem | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | - |
| C24 Neoplasia maligna de outra parte não especificada das vias biliares | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 6 | 6 | 4 | - |
| Masc | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - |
| Fem | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 6 | 2 | - |
| C25 Neoplasia maligna do pâncreas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 81 | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 13 | 21 | 18 | 19 | - |
| Masc | 31 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | - |
| Fem | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 14 | 11 | 14 | - |
| C26 Neoplasia maligna de outros órgãos digestivos e localizações mal definidas no aparelho digestivo | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 31 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 11 | - |
| Masc | 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | - |
| Fem | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 5 | - |
| C32 Neoplasia maligna da laringe | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 9 | 8 | 2 | - |
| Masc | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 9 | 7 | 2 | - |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| C33 Neoplasia maligna da traquéia | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| C34 Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 349 | - | - | - | - | - | - | 3 | 27 | 53 | 122 | 108 | 36 | - |
| Masc | 239 | - | - | - | - | - | - | 2 | 17 | 38 | 91 | 74 | 17 | - |
| Fem | 110 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 15 | 31 | 34 | 19 | - |
| C37 Neoplasia maligna do timo | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| C38 Neoplasia maligna do coração, mediastino e pleura | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 12 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | - |
| Masc | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Fem | 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 2 | - |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

| Continuação | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|--|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| C40 Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos membros | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| C41 Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 13 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | - |
| Masc | 9 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - |
| Fem | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - |
| C43 Melanoma maligno da pele | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 23 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | - |
| Masc | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | - |
| Fem | 10 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| C44 Outras neoplasia malignas da pele | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Masc | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| C48 Neoplasia maligna de retroperitônio e do peritônio | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 16 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Fem | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | - |
| C49 Neoplasia maligna do tecido conjuntivo e tecidos moles | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 13 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| Masc | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Fem | 9 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| C50 Neoplasia maligna da mama | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 196 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 24 | 45 | 33 | 46 | 40 | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Fem | 194 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 24 | 45 | 33 | 44 | 40 | - |
| C51 Neoplasia maligna da vulva | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - |
| Fem | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - |
| C52 Neoplasia maligna da vagina | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| C53 Neoplasia maligna do colo do útero | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 60 | - | - | - | - | - | - | 10 | 16 | 14 | 8 | 9 | 3 | - |
| Fem | 60 | - | - | - | - | - | - | 10 | 16 | 14 | 8 | 9 | 3 | - |
| C54 Neoplasia maligna do corpo do útero | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 6 | - |
| Fem | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 6 | - |
| C55 Neoplasia maligna do útero porção não especificada | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | - |
| Fem | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | - |
| C56 Neoplasia maligna do ovário | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 48 | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | 12 | 13 | 8 | 8 | - |
| Fem | 48 | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | 12 | 13 | 8 | 8 | - |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

Continuação

| | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| C57 Neoplasia maligna de outros órgãos genitais femininos e dos não especificados | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| C61 Neoplasia maligna da próstata | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 110 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 16 | 56 | 32 | - |
| Masc | 110 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 16 | 56 | 32 | - |
| C62 Neoplasia maligna do testículo | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| Masc | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| C64 Neoplasia maligna do rim exceto pelve renal | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 53 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 6 | 14 | 13 | 13 | - |
| Masc | 35 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 4 | 10 | 10 | 5 | - |
| Fem | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | - |
| C65 Neoplasia maligna da pelve renal | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| C67 Neoplasia maligna da bexiga | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 22 | 11 | - |
| Masc | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 16 | 8 | - |
| Fem | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 3 | - |
| C68 Neoplasia maligna de outros órgãos urinários e não especificados | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| C69 Neoplasia maligna do olho e anexos | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| C71 Neoplasia maligna do encéfalo | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 58 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 | 13 | 10 | 6 | - |
| Masc | 28 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | - |
| Fem | 30 | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | - |
| C72 Neoplasia maligna de medula espinhal dos nervos cranianos e de outras partes do sistema nervoso central | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 14 | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | - |
| Masc | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Fem | 9 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - |
| C73 Neoplasia maligna da glândula tireóide | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 1 | - |
| Masc | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
| Fem | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| C74 Neoplasia maligna da glândula supra-renal | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Masc | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| C75 Neoplasia maligna de outras glândulas endócrinas e de estruturas relacionadas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Fem | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

Continuação

| | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|--|-----------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| C76 Neoplasias malignas de outras localizações mal definidas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | - |
| Masc | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | - |
| Fem | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | - |
| C77 Neoplasia maligna secundária e não especificada dos gânglios linfáticos | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| C78 Neoplasia maligna secundária dos órgãos respiratórios e digestivos | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | - |
| Masc | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
| Fem | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
| C79 Neoplasia maligna secundária de outras localizações | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| C80 Neoplasia maligna sem especificação de localização | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 69 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 14 | 15 | 16 | 13 | - |
| Masc | 44 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 10 | 11 | 10 | 5 | - |
| Fem | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | - |
| C81 Doença de Hodgkin | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Fem | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| C83 Linfoma não Hodgkin difuso | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Fem | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| C84 Linfoma de células T cutâneas e periféricas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| C85 Linfoma não Hodgkin de outros tipos e de tipos não especificados | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 56 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 9 | 14 | 9 | 14 | 8 | - |
| Masc | 31 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 | 9 | 7 | 2 | 6 | - |
| Fem | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 2 | 12 | 2 | - |
| C90 Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plamócitos | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 7 | 4 | - |
| Masc | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | - | - |
| Fem | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 4 | - |
| C91 Leucemias linfóides | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 25 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | - |
| Masc | 19 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | - |
| Fem | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - |
| C92 Leucemia mieloide | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 39 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 2 | - |
| Masc | 19 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | - |
| Fem | 20 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | - |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

Continuação

| | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|---|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| C93 Leucemia monocítica | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Masc | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C94 Outras leucemias de células de tipo especificado | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| C95 Leucemia de tipo celular não especificado | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 8 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| Masc | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Fem | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| C97 Neoplasias malignas de localizações múltiplas independentes (primárias) | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - |
| Masc | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| D13 Neoplasias benignas de outras partes e de partes mal definidas do aparelho | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| D14 Neoplasia benigna do ouvido médio e aparelho respiratório | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| D18 Hemangioma e linfangioma de qualquer localização | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Fem | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| D25 Leiomioma do útero | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| D32 Neoplasia benigna das meninges | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| D37 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da cavidade oral e dos órgãos digestivos | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| Masc | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| D38 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do ouvido médio e dos órgãos respiratórios e intratorácicos | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| D39 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido dos órgãos genitais femininos | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| D42 Neoplasias de comportamento incerto ou desconhecido das meninges | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

Continuação

| | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|--|-----------|----------|-----|-----|----------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----|
| D43 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do encéfalo e do SNC | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Masc | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| D44 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido das glândulas endócrinas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| D46 Síndromes mielodisplásicas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - |
| Masc | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| D47 Outras neoplasias de comportamento incerto ou desconhecido dos tecidos linfático, hematopoiético e tecidos correlatos | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| III. Doenças do sangue órgãos hematopoiéticos e transtornos imunitários | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 34 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 10 | - |
| Masc | 13 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 4 | - |
| Fem | 21 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 4 | 5 | 6 | - |
| D53 Outras anemias nutricionais | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Fem | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| D61 Outras anemias aplásticas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| D64 Outras anemias | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 12 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - |
| Masc | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - |
| Fem | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - |
| D65 Coagulação intravascular disseminada | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| D68 Outros defeitos da coagulação | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| D69 Purpura e outras afecções hemorrágicas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Fem | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| D70 Agranulocitose | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Masc | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| D73 Doenças do baço | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

Continuação

| | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|---|------------|----------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----|
| D75 Outras doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| D81 Deficiências imunitárias combinadas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D86 Sarcoidose | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 457 | 7 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 24 | 64 | 103 | 137 | 108 | - |
| Masc | 190 | 3 | - | - | - | 1 | - | 2 | 13 | 33 | 54 | 59 | 25 | - |
| Fem | 267 | 4 | - | 1 | 2 | - | 3 | 5 | 11 | 31 | 49 | 78 | 83 | - |
| E04 Outros bócios não tóxicos | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| E10 Diabetes mellitus insulino-dependente | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 13 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | - |
| Masc | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Fem | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - |
| E11 Diabetes mellitus não-insulino dependente | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 60 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 12 | 10 | 19 | 15 | - |
| Masc | 24 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 7 | 4 | 8 | 3 | - |
| Fem | 36 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | 12 | - |
| E14 Diabetes mellitus não especificado | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 297 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 15 | 39 | 82 | 93 | 65 | - |
| Masc | 126 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 20 | 43 | 38 | 16 | - |
| Fem | 171 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 19 | 39 | 55 | 49 | - |
| E23 Hipofunção e outros transtornos da hipófise | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E27 Outros transtornos da glândula supra-renal | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E31 Disfunção poliglandular | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| E41 Marasmo nutricional | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Fem | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| E43 Desnutrição protéico-calórica grave n/especificada | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| Masc | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

Continuação

| | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|---|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| E46 Desnutrição protéico-calórica não especificada | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 27 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | - |
| Masc | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 4 | 3 | - |
| Fem | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 9 | - |
| E52 Deficiência de niacina | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| E66 Obesidade | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 14 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | - | 3 | 2 | - |
| Masc | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| Fem | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | - |
| E71 Distúrbios do metabolismo de aminoácidos de cadeia ramificada e do metabolismo dos ácidos graxos | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E72 Outros distúrbios do metabolismo de aminoácidos | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E78 Distúrbio do metabolismo de lipoproteínas e outras lipidemias | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 6 | 1 | - |
| Masc | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | - | - |
| Fem | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| E80 Distúrbios metabolismo porfirina e bilirrubina | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| E83 Distúrbios do metabolismo de minerais | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| E84 Fibrose cística | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E85 Amiloidose | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| E86 Repleção de volume | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 7 | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Fem | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 | - |
| E87 Outros transtornos do equilíbrio hidroeletrólítico e ácido-básico | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| V. Transtornos mentais e comportamentais | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 81 | - | - | - | - | 3 | 3 | 5 | 11 | 10 | 9 | 9 | 31 | - |
| Masc | 51 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 | 6 | 6 | 13 | - |
| Fem | 30 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 18 | - |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

Continuação

| | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|---|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| F01 Demência vascular | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
| Masc | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
| F03 Demência não especificada | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 24 | - |
| Masc | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | - |
| Fem | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 16 | - |
| F10 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 26 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | - |
| Masc | 26 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | - |
| F14 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F17 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| F19 Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| F20 Esquizofrenia | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| F29 Psicose nao-organica NE | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| F31 Transtorno afetivo bipolar | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| F32 Episódios depressivos | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| F33 Transtorno depressivo recorrente | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| F72 Retardo mental grave | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| F79 Retardo mental não especificado | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Fem | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| F84 Transtornos globais do desenvolvimento | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

Continuação

| | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|---|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| VI. Doenças do sistema nervoso | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 170 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 13 | 23 | 34 | 62 | - |
| Masc | 84 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | 16 | 13 | 21 | - |
| Fem | 86 | 2 | 4 | - | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 2 | 7 | 21 | 41 | - |
| G00 Meningite bacteriana NCOP | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Masc | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Fem | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| G04 Encefalite mielite e encefalomielite | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - |
| Masc | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| Fem | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| G06 Abscesso e granuloma intracraniano e intra-raquidianos | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| G09 Sequelas de doenças inflamatórias do SNC | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| G12 Atrofia muscular espinal e síndromes correlatas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - |
| Masc | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| G20 Doença de Parkinson | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 16 | - |
| Masc | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | - |
| Fem | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 12 | - |
| G30 Doença de Alzheimer | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 14 | 38 | - |
| Masc | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 16 | - |
| Fem | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 22 | - |
| G31 Outras doença degenerativas do sistema nervoso não classificado em outra parte | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Fem | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - |
| G35 Esclerose múltipla | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Masc | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| G37 Outras doenças desmielinizantes do sistema nervoso central | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| G40 Epilepsia | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Masc | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

Continuação

| | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|--|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| G41 Estado de mal epilético | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| G47 Distúrbios do sono | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| G60 Neuropatia hereditária e idiopática | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Fem | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| G61 Polineuropatia inflamatória | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| G62 Outras polineuropatias | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| G64 Outros transtornos do sistema nervoso periférico | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| G70 Miastenia gravis outros transtornos neuromusculares | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| G71 Transtornos primários dos músculos | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Masc | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| G80 Paralisia cerebral infantil | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 12 | - | 2 | - | 4 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Masc | 7 | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 5 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| G82 Paraplegia e tetraplegia | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| G91 Hidrocefalia | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| G93 Outros transtornos do encéfalo | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 11 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Masc | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - |
| Fem | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| G95 Outras doenças da medula espinal | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| G96 Outros transtornos do sistema nervoso central | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

Continuação

| | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|--|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| H66 Otite media não supurativa e as não especificadas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| IX. Doenças do aparelho circulatório | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 3.250 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | 16 | 63 | 182 | 362 | 659 | 911 | 1.048 | - |
| Masc | 1.521 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 11 | 38 | 112 | 244 | 374 | 421 | 317 | - |
| Fem | 1.729 | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 25 | 70 | 118 | 285 | 490 | 731 | - |
| I05 Doenças reumáticas da valva mitral | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - |
| Fem | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - |
| I06 Doenças reumáticas da valva aórtica | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Fem | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| I08 Doença de múltiplas valvas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| I10 Hipertensão essencial primária | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 18 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 12 | - |
| Masc | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 4 | - |
| Fem | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 8 | - |
| I11 Doença cardíaca hipertensiva | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 95 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 9 | 18 | 28 | 35 | - |
| Masc | 31 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 8 | 6 | - |
| Fem | 64 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 8 | 20 | 29 | - |
| I12 Doença renal hipertensiva | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | - |
| Masc | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - |
| Fem | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| I13 Doença cardíaca e renal hipertensiva | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 5 | - |
| Masc | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
| Fem | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | - |
| I20 Angina pectoris | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - |
| Masc | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
| Fem | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
| I21 Infarto agudo do miocárdio | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1.029 | - | - | - | - | 1 | 4 | 23 | 78 | 137 | 242 | 284 | 260 | - |
| Masc | 543 | - | - | - | - | - | 2 | 17 | 55 | 99 | 147 | 137 | 86 | - |
| Fem | 486 | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 23 | 38 | 95 | 147 | 174 | - |
| I22 Infarto do miocárdio recorrente | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

Continuação

| | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|--|------------|-------|-----|-----|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|----------|
| I24 Outras doenças isquêmicas agudas do coração | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| I25 Doença isquêmica crônica do coração | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 356 | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 33 | 74 | 108 | 131 | - |
| Masc | 167 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 19 | 37 | 55 | 50 | - |
| Fem | 189 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 14 | 37 | 53 | 81 | - |
| I26 Embolia pulmonar | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 58 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | 28 | - |
| Masc | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 7 | - |
| Fem | 42 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 21 | - |
| I27 Outras formas de doença cardíaca pulmonar | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
| Masc | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| I28 Outras doença dos vasos pulmonares | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| I30 Pericardite aguda | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| I31 Outras doenças do pericárdio | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 18 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | - |
| Masc | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
| Fem | 13 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | - |
| I33 Endocardite aguda e subaguda | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - |
| Masc | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - |
| I34 Transtornos não-reumáticos da valva mitral | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | - |
| Masc | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Fem | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | - |
| I35 Transtornos não reumática da valva aórtica | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 24 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 7 | 9 | - |
| Masc | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | - | - |
| Fem | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 9 | - |
| I38 Endocardite de valva não especificada | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Fem | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| I42 Cardiomiopatia | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 97 | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 3 | 19 | 25 | 24 | 17 | - |
| Masc | 61 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 16 | 15 | 17 | 6 | - |
| Fem | 36 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 | 11 | - |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

Continuação

| | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|--|------------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|
| I44 Bloqueio atrioventricular e do ramo esquerdo | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | - |
| Masc | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| Fem | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | - |
| I45 Outros transtornos de condução | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - |
| Masc | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| I46 Parada cardíaca | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| I48 Flutter e fibrilação atrial | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 6 | 10 | - |
| Masc | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - |
| Fem | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 10 | - |
| I49 Outras arritmias cardíacas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 12 | - |
| Masc | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - |
| Fem | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 9 | - |
| I50 Insuficiência cardíaca | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 228 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 10 | 16 | 36 | 55 | 108 | - |
| Masc | 91 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 7 | 9 | 22 | 21 | 29 | - |
| Fem | 137 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 14 | 34 | 79 | - |
| I51 Complicações de cardiopatias e doenças cardíacas mal definidas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 21 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | - |
| Masc | 11 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - |
| Fem | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 2 | - |
| I60 Hemorragia subaracnoide | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 62 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 12 | 7 | 15 | 8 | 11 | - |
| Masc | 18 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | - |
| Fem | 44 | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 3 | 10 | 7 | 9 | - |
| I61 Hemorragia intracerebral | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 98 | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 10 | 29 | 26 | 17 | 10 | - |
| Masc | 59 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 20 | 18 | 9 | 3 | - |
| Fem | 39 | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | - |
| I62 Hemorragia intracraniana não-traumática | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 97 | - | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 13 | 14 | 24 | 18 | 21 | - |
| Masc | 47 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 8 | 11 | 11 | 9 | 4 | - |
| Fem | 50 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | 9 | 17 | - |
| I63 Infarto cerebral | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 5 | - |
| Masc | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| Fem | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
| I64 Acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 283 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 7 | 17 | 41 | 92 | 123 | - |
| Masc | 114 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 22 | 39 | 42 | - |
| Fem | 169 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 9 | 19 | 53 | 81 | - |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

Continuação

| | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|--|------------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| I67 Outras doenças cerebrovasculares | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 252 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 24 | 43 | 85 | 92 | - |
| Masc | 101 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 15 | 27 | 37 | 19 | - |
| Fem | 151 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 9 | 16 | 48 | 73 | - |
| I69 Sequelas de doenças cerebrovasculares | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 162 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 22 | 65 | 68 | - |
| Masc | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 8 | 31 | 20 | - |
| Fem | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 | 34 | 48 | - |
| I70 Aterosclerose | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 20 | - |
| Masc | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | - |
| Fem | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| I71 Aneurisma e dissecação da aorta | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 120 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 17 | 28 | 41 | 23 | - |
| Masc | 73 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 12 | 22 | 21 | 10 | - |
| Fem | 47 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 6 | 20 | 13 | - |
| I72 Outros aneurismas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| I73 Outras doenças vasculares periféricas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | - |
| Masc | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
| Fem | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - |
| I74 Embolia e trombose arteriais | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 6 | - |
| Masc | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | - |
| Fem | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - |
| I77 Outras afecções das artérias e das arteríolas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - |
| Masc | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
| Fem | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| I80 Flebite e tromboflebite | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 5 | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Fem | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 5 | - |
| I82 Outras Embolias e trombose venosas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| I85 Varizes esofagianas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| I86 Varizes de outras localizações | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

Continuação

| | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|---|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------|
| I95 Hipotensão | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| X. Doenças do aparelho respiratório | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1.040 | 33 | 6 | 1 | 1 | 2 | 13 | 23 | 46 | 97 | 166 | 276 | 376 | - |
| Masc | 544 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 31 | 58 | 101 | 163 | 148 | - |
| Fem | 496 | 15 | 4 | - | - | 1 | 4 | 12 | 15 | 39 | 65 | 113 | 228 | - |
| J11 Influenza gripe devida a vírus não identificado | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| J12 Pneumonia viral não classificada em outra parte | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Masc | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| J15 Pneumonia bacteriana não classificada em outra parte | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 20 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 13 | - |
| Masc | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - |
| Fem | 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | - |
| J18 Pneumonia por microorganismos não especificados | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 238 | 18 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 6 | 16 | 8 | 23 | 53 | 107 | - |
| Masc | 105 | 9 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 13 | 6 | 10 | 28 | 31 | - |
| Fem | 133 | 9 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 25 | 76 | - |
| J21 Bronquiolite aguda | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| J22 Infecção aguda não especificada das vias aéreas inferiores | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 19 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | - |
| Masc | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
| Fem | 10 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | - |
| J42 Bronquite crônica não especificada | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - |
| Masc | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - |
| Fem | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - |
| J43 Enfisema | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 65 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 8 | 10 | 28 | 16 | - |
| Masc | 51 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 9 | 22 | 12 | - |
| Fem | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | - |
| J44 Outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 387 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 35 | 83 | 126 | 134 | - |
| Masc | 229 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 17 | 59 | 84 | 65 | - |
| Fem | 158 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 18 | 24 | 42 | 69 | - |
| J45 Asma | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 44 | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 6 | 13 | 10 | 7 | - |
| Masc | 12 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - |
| Fem | 32 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 11 | 8 | 6 | - |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

Continuação

| | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|---|-----------|----------|-----|-----|----------|-------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| J46 Estado de mal asmático | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 5 | - | - | - |
| Masc | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
| Fem | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - |
| J47 Bronquectasia | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Fem | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| J60 Pneumoconiose dos mineiros de carvão | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| J62 Pneumoconiose devido a poeira que contenha sílica | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Masc | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| J69 Pneumonite devida sólidos e líquidos | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| J81 Edema pulmonar não especificado de outra forma | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 82 | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 6 | 8 | 17 | 14 | 15 | 15 | - |
| Masc | 51 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 3 | 8 | 12 | 9 | 9 | 4 | - |
| Fem | 31 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 5 | 5 | 6 | 11 | - |
| J84 Outras doenças pulmonares intersticiais | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 11 | 9 | - |
| Masc | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 5 | - |
| Fem | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 7 | 4 | - |
| J85 Abscesso do pulmão e do mediastino | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| J86 Piotórax | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| J90 Derrame pleural não classificado em outra parte | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| J93 Pneumotórax | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| J96 Insuficiência respiratória não classificada em outra parte | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 16 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 10 | - |
| Masc | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | - |
| Fem | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | - |
| J98 Outros transtornos respiratórios | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 86 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 17 | 43 | - |
| Masc | 37 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 14 | - |
| Fem | 49 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 29 | - |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

Continuação

| | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|---|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| XI. Doenças do aparelho digestivo | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 498 | 1 | - | - | 1 | 4 | 3 | 36 | 84 | 96 | 88 | 96 | 89 | - |
| Masc | 315 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 31 | 68 | 74 | 63 | 44 | 30 | - |
| Fem | 183 | - | - | - | - | 2 | 2 | 5 | 16 | 22 | 25 | 52 | 59 | - |
| K11 Doenças das glândulas salivares | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| K21 Doença de refluxo gastroesofágico | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Masc | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| K22 Outras doenças do esôfago | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| K25 Úlcera gástrica | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 18 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 3 | 6 | - |
| Masc | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | - |
| Fem | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | - |
| K26 Úlcera duodenal | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| K27 Úlcera péptica de localização não especificada | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 7 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| Masc | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Fem | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| K28 Úlcera gastrojejunal | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| K29 Gastrite e duodenite | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 4 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
| Masc | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| K35 Apendicite aguda | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| Masc | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| K40 Hérnia inguinal | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| K41 Hérnia femoral | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| K43 Hérnia ventral | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

| Continuação | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|--|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| K44 Hérnia diafragmática | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - |
| Fem | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - |
| K46 Hérnia abdominal não especificada | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - |
| Masc | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| K50 Doença de Crohn | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Masc | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| K51 Colite ulcerativa | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| K55 Transtornos vasculares do intestino | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 40 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 10 | 14 | 12 | - |
| Masc | 18 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 7 | 3 | - |
| Fem | 22 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 7 | 9 | - |
| K56 Íleo paralítico e obstrução intestinal sem hérnia | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 11 | - |
| Masc | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
| Fem | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 10 | - |
| K57 Doença diverticular do intestino | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 6 | - |
| Masc | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | - |
| Fem | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - |
| K59 Outros transtornos funcionais do intestino | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| K60 Fissura e fistula das regiões anal e retal | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| K62 Outras doenças do reto e do anus | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| K63 Outras doenças do intestino | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | 1 | - |
| Masc | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
| Fem | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - |
| K65 Peritonite | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 18 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 6 | 6 | - |
| Masc | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | - |
| Fem | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | - |
| K66 Outras transtornos do peritônio | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

Continuação

| | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|---|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| K70 Doença alcoólica do fígado | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 161 | - | - | - | - | - | 2 | 17 | 48 | 54 | 24 | 15 | 1 | - |
| Masc | 143 | - | - | - | - | - | 1 | 17 | 42 | 48 | 22 | 12 | 1 | - |
| Fem | 18 | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 6 | 2 | 3 | - | - |
| K71 Doença hepática tóxica | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| K72 Insuficiência hepática não classificada em outra parte | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - |
| Masc | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - |
| Fem | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| K73 Hepatite crônica não classificada em outra parte | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| K74 Fibrose e cirrose hepática | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 65 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 18 | 18 | 8 | 13 | 3 | - |
| Masc | 47 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 14 | 13 | 7 | 8 | 1 | - |
| Fem | 18 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | - |
| K75 Outras doenças inflamatórias do fígado | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Fem | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| K76 Outras doenças do fígado | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | - |
| Masc | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Fem | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| K80 Colelitíases | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 16 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | - |
| Masc | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - |
| Fem | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | - |
| K81 Colecistite | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 6 | 6 | - |
| Masc | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - |
| Fem | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 5 | - |
| K82 Outras doenças da vesícula biliar | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| K83 Outras doenças das vias biliares | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - |
| Masc | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| K85 Pancreatite aguda | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 24 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | - |
| Masc | 14 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | - |
| Fem | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | - |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

Continuação

| | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|---|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| K86 Outras doenças do pâncreas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| K90 Má-absorção intestinal | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| K92 Outras doenças do aparelho digestivo | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | - |
| Masc | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 4 | - |
| Fem | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - |
| XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - |
| Masc | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| Fem | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - |
| L02 Abscesso cutâneo furúnculo e carbúnculo | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| L03 Celulite flegmão | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L10 Pênfigo | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| L89 Úlcera de decúbito | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| XIII. Doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 63 | - | - | - | 1 | - | - | 5 | 6 | 6 | 13 | 15 | 17 | - |
| Masc | 15 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | - |
| Fem | 48 | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 5 | 8 | 12 | 14 | - |
| M00 Artrite piogénica | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| M06 Outras artrites reumatóides | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 2 | - |
| Fem | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 2 | - |
| M13 Outras artrites | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| M30 Poliarterite nodosa e afecções correlatas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Masc | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

Continuação

| | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|--|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| M31 Outras vasculopatias necrotizantes | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| Masc | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| M32 Lúpus eritematoso disseminado sistêmico | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 13 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Fem | 11 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| M33 Dermatopoliomiosite | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| M34 Esclerose sistêmica | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Fem | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| M35 Outras afecções sistêmicas do tecido conjuntivo | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| M41 Escoliose | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| M43 Outras dorsopatias deformantes | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| M46 Outras espondilopatias inflamatórias | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| M50 Transtornos dos discos cervicais | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| M62 Outros transtornos musculares | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| M80 Osteoporose com fratura patológica | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| M81 Osteoporose sem fratura patológica | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| M84 Transtornos da continuidade do osso | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Fem | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - |
| M86 Osteomielite | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

Continuação

| | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|---|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| M87 Osteonecrose | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| XIV. Doenças do aparelho geniturinário | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 126 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 15 | 22 | 27 | 51 | - |
| Masc | 55 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7 | 13 | 13 | 18 | - |
| Fem | 71 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 8 | 9 | 14 | 33 | - |
| N00 Síndrome nefrítica aguda | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| N04 Síndrome nefrótica | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| N05 Síndrome nefrítica não especificada | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| N10 Nefrite tubulo-intersticial aguda | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Fem | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| N12 Nefrite túbulo-intersticial não especificada se aguda ou crônica | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - |
| Masc | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Fem | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
| N13 Uropatia obstrutiva e por refluxo | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| N15 Outras doenças renais túbulo-intersticiais | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| N17 Insuficiência renal aguda | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 9 | - |
| Masc | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | - |
| Fem | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | - |
| N18 Insuficiência renal crônica | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 47 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 12 | 13 | - |
| Masc | 15 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - |
| Fem | 32 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 | - |
| N19 Insuficiência renal não especificada | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 6 | - |
| Masc | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - |
| Fem | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - |
| N20 Calculose do rim e do ureter | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

Continuação

| | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|---|-----------|-------|-----|-----|-------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
| N28 Outros transtornos do rim e ureter não classificados em outra parte | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| N30 Cistite | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| N39 Outros transtornos do trato urinário | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 | 9 | - |
| Masc | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - |
| Fem | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 7 | - |
| N40 Hiperplasia da próstata | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 |
| Masc | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 |
| N42 Outras afecções da próstata | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| N49 Transtornos inflamatórios de órgãos genitais masculinos não classificados em outra parte | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| N62 Hipertrofia da mama | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| N73 Outras doenças inflamatórias pélvicas femininas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| N83 Transtornos não-inflamatório do ovário, da trompa de Falópio e do ligamento largo | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| XV. Gravidez parto e puerpério | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 12 | - | - | - | - | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 12 | - | - | - | - | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| O01 Mola hidatiforme | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| O05 Outros tipos de aborto | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| O06 Aborto não especificado | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| O26 Assistência materna por outras complicações ligadas predominantemente à gravidez | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| O85 Infecção puerperal | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

Continuação

| | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|--|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| O88 Embolia de origem obstétrica | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| O90 Complicações do puerpério não classificadas em outra parte | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| O99 Outras doenças da mãe classificadas em outra parte mas que complicam a gravidez, o parto e o puerpério | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| XVI. Algumas afeções originadas no período perinatal | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 178 | 170 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 98 | 95 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 80 | 75 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P00 Feto e recém-nascido afetados por afeções maternas, não obrigatoriamente relacionadas com a gravidez atual | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P01 Feto e recém-nascido afetados por complicações maternas da gravidez | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P02 Feto e recém-nascido afetados por complicações da placenta, do cordão umbilical e das membranas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P03 Feto e recém-nascido afetados por outras complicações do trabalho de parto e do parto | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P04 Feto e recém-nascido afetados por influências nocivas transmitidas ao feto via placenta ou leite materno | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P07 Transtornos relacionados com a gestação de curta duração e peso ao nascer, não classificados em outra parte | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P13 Lesões do esqueleto devido a trauma de parto | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P21 Asfixia ao nascer | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 8 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P22 Desconforto (angústia) respiratório (a) do recém-nascido | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

| Continuação | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|---|-----------|-----------|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| P23 Pneumonia congênita | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P24 Síndrome de aspiração neonatal | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P26 Hemorragia pulmonar originada do período perinatal | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P27 Doença respiratória crônica originada no período perinatal | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P28 Outras afecções respiratórias originadas no período perinatal | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P29 Transtornos cardiovasculares originados no período perinatal | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P36 Septicemia bacteriana do recém-nascido | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P37 Outras doenças infecciosas e parasitárias congênitas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P52 Hemorragia intracraniana não-traumática do feto e do recém-nascido | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P57 Kernicterus | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P60 Coagulação intravascular disseminada do feto e do recém-nascido | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P77 Enterocolite necrotizante do feto e do recém-nascido | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P83 Outras afecções comprometendo o tegumento específicas do feto e do recém-nascido | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

Continuação

| | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|--|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| XVII. Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 111 | 82 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Masc | 68 | 54 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| Fem | 43 | 28 | 8 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Q00 Anencefalia e malformações similares | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q01 Encefalocele | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q03 Hidrocefalia congênita | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 4 | 2 | 2 | - |
| Masc | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q04 Outras malformações congênitas do cérebro | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 4 | 3 | 1 | - |
| Masc | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q05 Espinha bífida | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | 1 | - |
| Fem | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q07 Outras malformações congênitas do sistema nervoso | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q20 Mal formações congênitas das câmaras e das comunicações cardíacas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 7 | 5 | 2 | - |
| Masc | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q21 Malformações congênitas dos septos cardíacos | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 10 | 6 | 3 | - | 1 | - | - |
| Masc | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Fem | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q22 Malformações congênitas das valvas pulmonar e tricúspide | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q23 Malformações congênitas valvas aórtica e mitral | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q24 Outras malformações congênitas do coração | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 17 | 12 | 2 | 2 | 1 | - |
| Masc | 11 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 6 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q25 Malformações congênitas das grandes artérias | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 10 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Masc | 8 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Fem | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

| Continuação | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|---|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| Q37 Fenda labial com fenda palatina | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q39 Malformações congênicas do esôfago | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q41 Ausência atresia estenose congênita intestino delgado | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q44 Malformações congênicas da vesícula biliar e fígado | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q61 Doenças císticas do rim | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Masc | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q77 Osteocondrodisplasia com anomalias de crescimento dos ossos longos e da coluna vertebral | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q79 Malformações congênicas do sistema osteomuscular não classificadas em outra parte | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q81 Epidermolise bolhosa | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q87 Outras síndromes com malformações congênicas que acometem múltiplos sistemas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 7 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Q89 Outras malformações congênicas não classificadas em outra parte | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 12 | 9 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 9 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Q90 Síndrome de Down | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 5 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Masc | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Q91 Síndrome de Edwards e Síndrome de Patau | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q92 Outras trissomias e trissomias parciais dos autossomos, não classificadas em outra parte | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

Continuação

| | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|---|------------|-----------|-----|-----|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| O99 Outras anomalias dos cromossomos não classificadas em outra parte | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XVIII. Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e laboratoriais | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 103 | 11 | - | - | 1 | 1 | 7 | 5 | 8 | 15 | 12 | 9 | 33 | 1 |
| Masc | 52 | 4 | - | - | - | - | 6 | 2 | 8 | 11 | 8 | 6 | 6 | 1 |
| Fem | 51 | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 4 | 4 | 3 | 27 | - |
| R04 Hemorragia das vias respiratórias | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| R09 Outros sintomas e sinais relativos aos aparelhos circulatório e respiratório | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Fem | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - |
| R54 Senilidade | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Masc | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Fem | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| R56 Convulsões não classificada em outra parte | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| R64 Caquexia | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Fem | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - |
| R68 Outros sintomas e sinais gerais | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| R95 Síndrome da morte súbita na infância | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R96 Outras Mortes súbitas de causa desconhecida | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| R98 Morte sem assistência | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 14 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | 3 | 1 |
| Masc | 10 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 1 |
| Fem | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - |
| R99 Outras causas mal definidas e as não especificadas de mortalidade | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 45 | 3 | - | - | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 5 | 4 | - |
| Masc | 28 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | - |
| Fem | 17 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | - |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

| Continuação | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| XX. Causas externas de morbidade e mortalidade | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 903 | 21 | 13 | 14 | 19 | 89 | 278 | 165 | 105 | 68 | 44 | 50 | 37 | - |
| Masc | 734 | 12 | 9 | 9 | 12 | 83 | 249 | 146 | 87 | 50 | 30 | 32 | 15 | - |
| Fem | 169 | 9 | 4 | 5 | 7 | 6 | 29 | 19 | 18 | 18 | 14 | 18 | 22 | - |
| V03 Pedestre traumatizado em colisão com um automóvel [carro], "pick up" ou caminhonete | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| V05 Pedestre traumatizado em colisão com trem ou um veículo ferroviário | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| V09 Pedestres traumatizados em outros acidentes de transporte ou em acidentes de transporte não especificados | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 46 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 1 | - |
| Masc | 32 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | - |
| Fem | 14 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - |
| V12 Ciclista traumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou três rodas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| V19 Ciclista traumatizado em outros acidentes de transporte e em acidentes de transporte não especificados | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| V23 Motociclista traumatizado em colisão com um automóvel, pickup ou caminhonete | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| V29 Motociclista traumatizado em outros acidentes de transportes e em acidentes de transportes não especificados | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Masc | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| V43 Ocupante de automóvel traumatizado em colisão com automóvel, pickup caminhonete | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| V44 Ocupante de automóvel [carro] traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou ônibus | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 5 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Masc | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| V48 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado com um objeto fixo ou parado | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| V49 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em outros acidentes de transporte e em acidente de transporte não especificados | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 8 | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
| Masc | 7 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| V63 Ocupante de veículo transporte pesado traumatizado em colisão com automóvel ou caminhonete | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| V68 Ocupante de veículo transporte pesado traumatizado em acidente de transporte sem colisão | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

Continuação

| | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|--|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| V78 Ocupante de ônibus traumatizado em acidente de transporte sem colisão | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V80 Pessoa montada em animal ou ocupante de um veículo de tração animal traumatizado em um acidente de transporte | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V90 Acidente com embarcação causando afogamento e submersão | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| W01 Queda no mesmo nível por escorregão, tropeção ou passo em falso | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| W06 Queda de um leito | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Masc | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| W08 Queda de outro tipo de mobília | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| W10 Queda em ou de escada ou degraus | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Masc | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| W12 Queda em ou de um andaime | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Masc | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| W13 Queda de ou para fora de edifícios ou outras estruturas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| W16 Mergulho ou pulo na água causando outro traumatismo que não afogamento ou submersão | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| W17 Outras quedas de um nível a outro | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| W18 Outras quedas no mesmo nível | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 11 | - |
| Masc | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - |
| Fem | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | - |
| W19 Queda sem especificação | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 26 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | - |
| Masc | 19 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | - |
| Fem | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - |
| W23 Apertado, colhido, comprimido ou esmagado dentro de ou entre objetos | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

Continuação

| | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|---|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| W25 Contato com vidro cortante | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| W49 Exposição a outras forças mecânicas inanimadas e às não especificadas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| W54 Mordedura ou golpe provocado por cão | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| W67 Afogamento e submersão em piscina | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| W68 Afogamento e submersão conseqüente a queda dentro de piscina | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| W69 Afogamento e submersão em águas naturais | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 22 | - | - | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| Masc | 19 | - | - | 1 | - | 5 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | - |
| Fem | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| W74 Afogamento e submersão não especificados | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 9 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Masc | 8 | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| W78 Inalação do conteúdo gástrico | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 13 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Masc | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Fem | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| W79 Inalação e ingestão de alimentos causando obstrução do trato respiratório | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 7 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 5 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| W80 Inalação e ingestão de outros objetos causando obstrução do trato respiratório | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| W81 Confinado ou aprisionado em ambiente pobre em oxigênio | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| W84 Riscos não especificados para a respiração | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Fem | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| W87 Exposição a corrente elétrica não especificada | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Masc | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| W99 Exposição a outros fatores artificiais e aos não especificados | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

Continuação

| | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|---|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| X00 Exposição a fogo não controlado em um edifício ou outro tipo de construção | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| X04 Exposição a combustão de substância muito inflamável | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| X09 Exposição a tipo não especificado de fumos, fogos ou chamas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 9 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - |
| Masc | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| Fem | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| X11 Contato com água corrente quente de torneira | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| X19 Contato com outras fontes de calor ou com substâncias quentes não especificados | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| X41 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a anticonvulsivantes [antiepiléticos], sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos, não classificados em outra parte | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| X44 Envenenamento acidental por e exposição a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas não especificadas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| X59 Exposição a fatores não especificados | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| X61 Auto-intoxicação intencional a drogas anticonvulsivantes, sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não classificados em outra parte | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| X69 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outros produtos químicos e a substâncias nocivas não especificadas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| X70 Lesão autoprovocada intencionalmente por enforcamento, estrangulamento e sufocação | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 43 | - | - | - | - | 2 | 9 | 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | - |
| Masc | 37 | - | - | - | - | 2 | 9 | 7 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | - |
| Fem | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| X71 Lesão autoprovocada intencionalmente por afogamento e submersão | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| X72 Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de arma de fogo de mão | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

| Continuação | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|--|--------------|------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| X74 Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de outra arma de fogo e de arma de fogo não especificada | Total | 34 | - | - | - | - | 5 | 11 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | - |
| Masc | 29 | - | - | - | - | 5 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | - | - |
| Fem | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| X76 Lesão autoprovocada intencionalmente por fumaça, fogo e chamas | Total | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| X78 Lesão autoprovocada intencionalmente por objeto cortante ou penetrante | Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| X80 Lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação de um lugar elevado | Total | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Masc | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Fem | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| X82 Lesão autoprovocada intencionalmente por impacto de um veículo a motor | Total | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| X84 Lesão autoprovocada intencionalmente por meios não especificados | Total | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| X91 Agressão por meio de enforcamento, estrangulamento e sufocação | Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| X93 Agressão por meio de disparo de arma de fogo de mão | Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| X94 Agressão por meio de disparo de espingarda, carabina ou arma de fogo de maior calibre | Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| X95 Agressão por meio de disparo de outra arma de fogo ou de arma não especificada | Total | 355 | - | - | 4 | 11 | 53 | 164 | 69 | 27 | 15 | 6 | 6 | - |
| Masc | 326 | - | - | 3 | 7 | 50 | 153 | 65 | 23 | 14 | 6 | 6 | 5 | - |
| Fem | 29 | - | - | 1 | 4 | 3 | 11 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | - |
| X97 Agressão por meio de fumaça, fogo e chamas | Total | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Masc | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| X99 Agressão por meio de objeto cortante ou penetrante | Total | 24 | - | - | - | - | 3 | 12 | 5 | 3 | 1 | - | - | - |
| Masc | 22 | - | - | - | - | 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Y00 Agressão por meio de objeto contundente | Total | 9 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
| Masc | 6 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Fem | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

| Continuação | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|---|-----------|----------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
| Y04 Agressão por meio de força corporal | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Y09 Agressão por meios não especificados | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 11 | - | - | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Masc | 7 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Fem | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Y15 Envenenamento por e exposição ao álcool, intenção não determinada | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Y17 Envenenamento por e exposição a outros gases e vapores, intenção não determinada | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Y21 Afogamento e submersão intenção não determinada | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 8 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Masc | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Fem | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Y24 Disparo de outra arma de fogo e de arma de fogo não especificada, intenção não determinada | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Y26 Exposição a fumaça, fogo e chamas, intenção não determinada | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Y28 Contato objeto cortante ou penetrante intenção não determinada | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Y29 Contato com objeto contundente intenção não determinada | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 7 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - |
| Masc | 6 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Y30 Queda, salto ou empurrado de um lugar elevado, intenção não determinada | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Fem | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Y34 Fatos ou eventos não especificados, intenção não determinada | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
| Masc | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Fem | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Y83 Reação anormal em paciente ou complicação tardia causadas por intervenção cirúrgica e por outros atos cirúrgicos, sem menção de acidente durante a intervenção | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Y85 Seqüelas de acidente de transporte | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fem | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2000

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2000

Continuação

| | Total | <1Ano | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 e+ | Ign |
|--|----------|-------|-----|-----|-------|-------|----------|-------|-------|----------|----------|----------|-------|-----|
| Y86 Seqüelas de outros acidentes | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Masc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Y87 Seqüelas de lesão autoprovocada intencionalmente, agressão ou de fato cuja intenção é indeterminada | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Y88 Seqüelas de cuidados médico ou cirúrgico considerados como causa externa | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Y89 Seqüelas de outras causas externas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Masc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |

Continua