



PROVA OBJETIVA – Nível Superior
CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA - ENDOCRINOLOGIA
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS

CONCURSO PÚBLICO – Edital de Abertura nº 059/2022

ANTES DA PROVA:



**Olá! Leia as orientações
para a realização da prova conforme
o Edital de Abertura. Boa sorte!**



- * Confira seus dados na Grade de Respostas: Nome, Nº de Inscrição e Cargo. Caso haja equívoco, comunique imediatamente ao fiscal da sala.
- * Verifique se este caderno corresponde ao cargo ao qual você realizou sua inscrição e contém o número de questões conforme expresso em edital. Caso contrário, solicite a substituição do caderno.
- * Selecione APENAS UMA alternativa correta para cada questão, que contam com 5 alternativas de resposta (A, B, C, D, E).
- * Seus aparelhos eletrônicos (relógios, celulares...) devem estar acondicionados dentro do envelope de segurança fornecido, que deve ser lacrado antes de entrar na sala.

DURANTE A PROVA:



- * Preencha e assine a Grade de Respostas e a Ata de Presença, conforme o documento apresentado, utilizando caneta preta ou azul. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira, borracha, marca-texto e outros itens durante a realização da prova.
- * Preencha a Grade de Respostas marcando apenas uma alternativa para cada questão. Questões rasuradas, com mais de uma marcação ou em branco serão anuladas.
- * Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de materiais de consulta de qualquer natureza.
- * Nenhuma questão será anulada durante o período de prova. Escolha sempre uma das alternativas. Você poderá solicitar Recurso Administrativo sobre o gabarito preliminar, conforme datas do cronograma de execução.
- * Fique atento ao tempo de realização da prova, incluindo o preenchimento da Grade de Respostas conforme orientação apresentada na sala.

APÓS A PROVA:



- * Você poderá levar consigo o Caderno de Questões após 02 (duas) horas do início da prova.
- * Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal da sala, aguardando a autorização para entregar a Grade de Respostas.
- * Os dois últimos candidatos devem permanecer em sala a fim de assinar o termo de encerramento das atividades da sala.
- * O gabarito preliminar será divulgado conforme o cronograma de execução deste edital.



Direitos autorais reservados à Fundação La Salle.
Proibida Reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

Acesse o site:
www.fundacaolasalle.org.br/concursos
ou utilize o QR code ao lado.



LÍNGUA PORTUGUESA

As questões de número 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

A geração Covid: o impacto da pandemia no desenvolvimento das crianças

01 A conta chegou! Como era de esperar, a pandemia deixou cicatrizes no
02 desenvolvimento dos nossos filhos. É o que documentam os primeiros estudos sobre a
03 chamada Geração Covid, aquela que nasceu ou cresceu durante o período de restrições
04 desencadeadas pelo coronavírus.

05 Com o isolamento social e uma rotina distante de outras crianças e da escola, boa parte
06 dos pequenos teve experiências limitadas numa etapa da vida marcada por descobertas e a
07 exploração do mundo. O universo ficou confinado ___ paredes de casa, a interação com os
08 outros encolheu e o acesso __ educação e às opções de lazer também saiu prejudicado.

09 Já dava para antever os efeitos desse cenário conturbado no desenvolvimento físico,
10 _____ e emocional dos mais novos. E, de fato, a ciência desnuda agora as consequências.

11 Uma pesquisa da Universidade Colúmbia, nos Estados Unidos, comparou a evolução
12 esperada de bebês de 6 meses nascidos antes e durante a pandemia. Resultado: os
13 especialistas notaram que os pequenos que _____ ao mundo em meio ao isolamento
14 tiveram pontuações mais baixas no desenvolvimento motor — importante para virar sozinho de
15 barriga pra baixo e pegar um brinquedo com as mãos, por exemplo — e socioemocional, aquele
16 que molda o convívio com pessoas fora do círculo familiar.

17 Para a psicóloga Maria Beatriz Martins Linhares, professora sênior da Faculdade de
18 Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP), esses achados eram
19 previstos. “A primeira infância é a fase em que a arquitetura cerebral está pulsante, é o momento
20 ideal para aprender e ganhar habilidades básicas para a trajetória do desenvolvimento humano”,
21 justifica. É nessa janela temporal que o contato com a natureza e os outros, as brincadeiras ao
22 ar livre e a vivência de desafios estimulam o cérebro e _____ o corpo crescer com saúde.

23 Tudo isso foi podado entre os filhos da pandemia. “A restrição das atividades nos
24 primeiros anos de vida claramente impacta no curto, no médio e no longo prazo. A área do
25 cérebro ligada __ integração social fica comprometida, bem como as habilidades cognitivas e
26 as relacionadas ao planejamento motor”, resume a neuropediatra Liubiana Arantes, presidente
27 do Departamento de Pediatria do Desenvolvimento da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

28 As descobertas do estudo de Colúmbia, e de tantos outros tocados pelo globo, tornam
29 mais palpável a angústia dos pais dessa geração. _____ daqueles que começaram a
30 desconfiar de atrasos no aprendizado de tarefas como engatinhar, andar e falar.

31 A saúde mental também não passou em branco — mesmo entre os novinhos de tudo.
32 No Brasil, um estudo conduzido pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e a
33 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apontou um crescimento significativo no número
34 de bebês que, aos 6 meses, apresentavam irritabilidade e dificuldades de adaptação à rotina.

35 “Sabemos que a pandemia aumentou a sobrecarga dos pais, e esses comportamentos
36 infantis podem ser entendidos como um reflexo do estresse parental, do uso frequente de telas
37 ou mesmo da falha em compreender e atender as demandas das crianças”, analisa __ pediatra
38 Claudia Lindgren Alves, professora da UFMG e coordenadora do trabalho.

39 Segundo Maria Beatriz, o estresse crônico, em todos os sentidos, deve ser encarado
40 como um fator de risco para o desenvolvimento infantil. “A chance de haver impactos negativos
41 em um cenário estressor é sempre potencializada”, afirma a psicóloga e docente da USP.

Disponível em < <https://saude.abril.com.br/familia/a-geracao-covid-o-impacto-da-pandemia-no-desenvolvimento-das-criancas/> > (adaptado).

01. Considerando o emprego do sinal indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 07, 08, 25 e 37.

- A) as – à – à – a.
- B) às – a – à – a.
- C) às – à – à – a.
- D) às – à – à – à.
- E) as – à – a – a.

02. Considerado a ortografia vigente, as lacunas das linhas 10, 13, 22 e 29 devem ser, respectivamente, preenchidas por

- A) psíquico – chegaram – fazem – Sobre tudo.
- B) psíquico – chegaram – fazem – Sobretudo.
- C) písíquico – chegarão – faz – Sobretudo.
- D) pissíquico – chegarão – faz – Sobretudo.
- E) písíquico – chegaram – faz – Sobre tudo.

03. Sobre as palavras “psicóloga” e “achados”, avalie as afirmações abaixo e assinale (V) para Verdadeiro e (F) para Falso.

- () Ambas são paroxítonas.
() Ambas possuem hiato.
() Somente a segunda possui dígrafo.
() A primeira possui tritongo.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V – V.
B) V – F – V – F.
C) F – F – F – F.
D) V – V – F – V.
E) F – F – V – F.

04. Na linha 01, o verbo “deixou”, no contexto em que se encontra, é

- A) intransitivo.
B) transitivo direto.
C) transitivo indireto.
D) transitivo direto e indireto.
E) de ligação.

05. Analise as afirmativas abaixo.

- I - Na linha 07, o termo “O universo”, no contexto em que se encontra, é o sujeito da oração.
II - Na linha 12, o termo “a”, no contexto em que se encontra, é adjunto adnominal.
III - Na linha 31, o termo “saúde”, no contexto em que se encontra, é o núcleo do sujeito composto.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
B) Apenas a II.
C) Apenas a III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

06. Com base no texto, analise as afirmativas abaixo.

- I - O texto ratifica que a pandemia trouxe malefícios para as crianças.
II - Maria Beatriz Linhares não concorda com os resultados obtidos pela pesquisa da Universidade Colúmbia.
III - Somente a Universidade Colúmbia realizou estudos sobre o assunto abordado no texto.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
B) Apenas a II.
C) Apenas a III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

07. Analise o trecho a seguir:

“Com o isolamento social e uma rotina distante de outras crianças e da escola, boa parte dos pequenos teve experiências limitadas numa etapa da vida marcada por descobertas e a exploração do mundo.”

Ao trocarmos a expressão “boa parte dos pequenos” por “os pequenos”, quantas palavras sofreriam, obrigatoriamente, alteração para fins de concordância?

- A) Uma
B) Duas
C) Três
D) Quatro
E) Cinco

08. Em “As descobertas do estudo de Colúmbia, e de tantos outros tocados pelo globo, tornam mais palpável a angústia dos pais dessa geração.” é correto afirmar que há,

- A) conjunção alternativa e interjeição.
- B) advérbio e artigo indefinido.
- C) pronome possessivo e conjunção alternativa.
- D) artigo indefinido e preposição essencial.
- E) artigo definido e preposição essencial.

09. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

(1) Verbo pertencente à primeira conjugação.	() Chegou
(2) Verbo pertencente à segunda conjugação.	() Impacta
(3) Verbo pertencente à terceira conjugação.	() Sabemos
	() Saiu

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- A) 1 – 1 – 2 – 3.
- B) 1 – 1 – 3 – 2.
- C) 3 – 3 – 1 – 3.
- D) 2 – 3 – 1 – 2.
- E) 1 – 3 – 2 – 1.

10. Observe as seguintes perguntas:

- I – Quantos bebês participaram da pesquisa realizada pela Universidade Colúmbia?
- II – Qual o cargo de Liubiana Arantes na Sociedade Brasileira de Pediatria?
- III – Quem faz parte da Geração Covid?

Das perguntas acima, qual(is) é(são) respondida(s) pelo texto?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

LEGISLAÇÃO

11. No que tange à Lei de Improbidade Administrativa, da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública caberá:

- A) Mandado de segurança.
- B) Apelação.
- C) Agravo de instrumento.
- D) Recurso ordinário.
- E) Recurso extraordinário.

12. No que tange ao Estatuto do Idoso, relativamente ao seu direito à saúde, marque a alternativa INCORRETA:

- A) Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 (oitenta) anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência.
- B) À pessoa idosa que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável.
- C) À pessoa idosa internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico.
- D) É vedada a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.
- E) O idoso que não esteja no pleno gozo de suas faculdades mentais, incapaz de optar pela realização de tratamento de saúde, deverá ser encaminhado por seu médico quando ocorrer iminente risco de morte, independente de notificação a familiares ou ao Ministério Público, em razão do estado de necessidade do paciente.

13. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, são requisitos para a concessão de pedidos de colocação em família substituta, EXCETO:

- A) Qualificação completa do requerente e de seu eventual cônjuge, ou companheiro, com expressa anuência deste.
- B) Certidão do trânsito em julgado da sentença penal condenatória que destituiu o poder familiar dos pais biológicos.
- C) Declaração sobre a existência de bens, direitos ou rendimentos relativos à criança ou ao adolescente.
- D) Indicação de eventual parentesco do requerente e de seu cônjuge, ou companheiro, com a criança ou adolescente, especificando se tem ou não parente vivo.
- E) Indicação do cartório onde foi inscrito nascimento, anexando, se possível, uma cópia da respectiva certidão.

14. No que concerne à Lei Maria da Penha, marque a alternativa CORRETA:

- A) Os crimes praticados contra a mulher serão julgados pelos Juizados Especiais Criminais, previstos na Lei nº 9099/95.
- B) Os delitos punidos na Lei Maria da Penha são de ação penal pública incondicionada, isto é, independem da vontade da vítima quando do oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.
- C) Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, sem exceções.
- D) Como medida protetiva de distanciamento do agressor em relação à vítima, os juízes, por força de previsão na Lei, fixam o mínimo de 200 (duzentos) metros entre os envolvidos.
- E) Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

15. Os servidores da Secretaria Municipal de Saúde e Serviço Social em atividades em creches e unidades sanitárias terão uma gratificação correspondente a:

- A) 20% (vinte por cento) do valor líquido do respectivo cargo, sobre o qual incidem gratificações.
- B) 20% (vinte por cento) do valor básico inicial do respectivo cargo, sem a incidência de vantagens.
- C) 25% (vinte e cinco por cento) do valor básico inicial do respectivo cargo, sobre o qual não incidirão quaisquer gratificações ou vantagens.
- D) 25% (vinte e cinco por cento) do valor bruto do respectivo cargo, sobre o qual incidem gratificações.
- E) 30% (trinta por cento) do valor básico inicial do respectivo cargo, sobre o qual não incidirão quaisquer gratificações ou vantagens.

16. Dos direitos à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana e ao esporte e lazer NÃO compreendem:

- A) A produção, a comercialização, a aquisição e o uso de artigos e materiais religiosos adequados aos costumes e às práticas fundadas na respectiva religiosidade, ressalvadas as condutas vedadas por legislação específica.
- B) A comunicação ao Ministério Público para abertura de ação penal em face de atitudes e práticas de intolerância religiosa nos meios de comunicação e em quaisquer outros locais.
- C) A assistência religiosa aos praticantes de religiões de matrizes africanas internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, excluindo-se àqueles submetidos a pena privativa de liberdade.
- D) A capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional, nos termos da Lei Maior.
- E) É facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas pelos capoeiristas e mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos.

17. Segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Porto Alegre, relativamente ao aproveitamento é INCORRETO afirmar que:

- A) No aproveitamento, terá preferência o que estiver a mais tempo em disponibilidade e, no caso de empate, o que contar mais tempo de serviço público municipal
- B) O funcionário que, no prazo de trinta dias, não entrar em exercício será considerado em abandono do cargo.
- C) O aproveitamento dependerá de prova de capacidade física e mental, mediante perícia médica.
- D) Em casos de aproveitamento, provada em perícia médica a incapacidade definitiva para o serviço público em geral, o funcionário será aposentado.
- E) O funcionário não poderá ser aproveitado a pedido em cargo de natureza diversa daquele de que era titular.

18. No que concerne ao direito à cultura, à educação, ao esporte e ao lazer, pelo Estatuto Estadual da Igualdade Racial, o Estado deverá promover políticas que valorizem a cultura por exemplo:

- A) Do *hip hop*, do *rap* e do *funk*.
- B) Do *hip hop*, do *brake dance* e do *blues*.
- C) Do *rap* e da pintura de grafite.
- D) Do *brake dance* e do *funk*.
- E) Do *hip hop* e do sertanejo universitário.

19. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, segundo a Constituição Federal, é de competência:

- A) Exclusiva dos municípios.
- B) Privativa dos Estados.
- C) Privativa da União e do Distrito Federal.
- D) Comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- E) Comum dos Estados e municípios, apenas.

20. De acordo com expressa previsão da Lei complementar 478/2002, NÃO são consideradas acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho:

- I - a doença degenerativa.
- II - a inerente a grupo etário.
- III - a que não produza incapacidade laborativa.
- IV - a síndrome do pânico e a síndrome de *burnout*.

Das assertivas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas I, II e III.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e IV.
- E) Apenas IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Paciente feminina, 19 anos, diagnóstico prévio de diabetes mellitus tipo 1, chega à emergência com dor abdominal, desidratação, taquipneia, glicemia de 437, potássio de 3,9, pH de 7.2 em gasometria arterial, cetonemia positiva. Qual a conduta recomendada?

- A) Restaurar estado volêmico com infusão de soro glicosado com eletrólitos a 250 ml/hora.
- B) Correção rápida do pH com infusão contínua de bicarbonato de sódio até atingir pH de 7,45 em gasometria.
- C) Iniciar infusão endovenosa de insulina, almejando queda na glicemia de 50-80mg/dl/hora.
- D) Reposição endovenosa de potássio em bolus, postergando início de insulina até potássio sérico atingir valores superiores a 4,5mEq/L.
- E) Iniciar NPO, prescrição de insulina NPH e regular subcutâneas conforme esquema de uso em domicílio e nova glicose em 4 horas.

22. Homem de 54 anos, ressecção de macroadenoma não-funcionante de hipófise há 6 meses, volta para consulta de revisão. Nega sintomas neurológicos ou visuais, nega alterações de libido ou poliúria, mas refere ganho de peso de 8kg desde a cirurgia (IMC atual de 32). Em uso de enalapril 10mg de 12/12h. RM de sela com lesão residual de 0,4x0,3x0,2 cm, em topografia adjacente a saio cavernoso esquerdo. Traz os seguintes exames, com valores de referência entre parênteses: Prolactina 10 (até 23), IGF-1 98 (50 a 310), TSH 2,4 (0,49 a 4,2) T4L 1,08 (0,48 a 1,46), ACTH 28 (até 54), cortisol matinal 18 (4,3 a 19,2), Testosterona total 620 (128 a 720). Indicado teste de estímulo com glucagon, com GH atingindo pico de 2,3ng/ml. A interpretação correta é:

- A) O teste indica deficiência de GH do adulto, mas tratamento não está indicado devido a presença de lesão residual.
- B) O IGF-1 do paciente é normal, mas a resposta ao teste é anormalmente baixa, e deve ser realizado outro teste confirmatório.
- C) O IGF-1 do paciente é normal, mas a resposta ao teste é anormalmente baixa, e deve se indicar reposição de GH.
- D) O paciente apresenta resposta normal ao estímulo e tratamento com GH não está indicado.
- E) O teste foi desnecessário, uma vez que o IGF-1 está dentro do valor de referência.

23. Paciente de 20 anos, com insuficiência cardíaca congestiva por cardiopatia congênita parcialmente corrigida, internada para cardiologia para planejamento de nova abordagem cirúrgica. Solicitada avaliação do endocrinologista por TSH 0,024 e T4L 1,23 em exames pré-operatórios. Paciente no leito, sem queixas, frequência cardíaca de 72, PA 120/83, tireoide sem nódulos palpáveis, indolor, sem frêmito, sem tremor fino de extremidades, sem alterações oculares. Paciente refere acompanhamento médico regular desde a infância, com aderência aos medicamentos e dieta hipossódica prescrita. Revisando exames anteriores, TSH de 2,3 e T4L de 1,14 há 4 semanas, TC de tórax sem contraste há 3 semanas (sem alterações), cateterismo cardíaco de câmaras direitas há 2 semanas, demonstrando hipertensão pulmonar moderada. São feitas as seguintes afirmativas:

- I - A dieta hipossódica pode estar relacionada com baixa ingestão de iodo, porém, como a tomografia foi sem contraste, é possível descartar que alteração seja decorrente do efeito da administração de iodo.
- II - Mesmo sem estigmas clínicos, a possibilidade de doença de Graves deve ser considerada e investigação adicional deve ser realizada.
- III - Tapazol deve ser iniciado imediatamente, devido ao alto risco da paciente.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III

24. Paciente feminina, branca, 65 anos, apresenta alteração em densitometria óssea com escore T de -2,7 em coluna lombar, -2,4 em colo femoral, -2,3 em fêmur total. Nega medicamentos de uso contínuo, nega tabagismo e etilismo, nega fraturas prévias, mãe com osteoporose. Realiza hidroginástica 3x por semana. Função renal normal, sem história de patologias de trato digestivo. Após excluir causas secundárias de osteoporose, o melhor tratamento seria:

- A) Iniciar reposição de cálcio e vitamina D e orientar atividade física de maior impacto.
- B) Iniciar alendronato semanal, com plano de 5 anos de tratamento.
- C) Iniciar denosumab anual, com plano de 3 anos de tratamento.
- D) Iniciar reposição estrogênica.
- E) Iniciar ácido zoledrônico semestral, com plano de 5 anos de tratamento.

25. Sobre as características dos hormônios, marque V para verdadeiro ou F para falso.

- () Insulina é um hormônio peptídico secretado com pró-hormônio.
- () A vasopressina é um hormônio peptídico produzido na neuro-hipófise.
- () O córtex adrenal produz hormônios esteróides lipossolúveis.
- () O glucagon é um hormônio peptídico secretado pela célula beta pancreática.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F – V.
- B) V – V – V – V.
- C) F – V – F – V.
- D) V – F – V – F.
- E) F – F – V – F.

26. Em um paciente com hipoparatiroidismo associado a enteropatia disabsortiva, gerando hipocalcemia de difícil manejo, além de insuficiência adrenal primária, deve ser considerado qual diagnóstico?

- A) Síndrome poliglandular autoimune do tipo 1.
- B) Síndrome poliglandular autoimune do tipo 2.
- C) IPEX (desregulação imune, poliendocrinopatia e enteropatia ligada ao X).
- D) Neoplasia endócrina múltipla do tipo 1.
- E) Neoplasia endócrina múltipla do tipo 2.

27. Analise os pacientes a seguir, que possuem indicação para realização de cirurgia bariátrica:

Paciente A	Paciente masculino, 56 anos, IMC 42, ganho de peso importante após os 40 anos, DM2 em uso de insulina NPH+Regular com hemoglobina glicada de 9%, hipertenso não controlado com 4 drogas diversas interações por celulite de membros inferiores, osteoporose descoberta após fratura de colo de fêmur há 2 anos, limitação de mobilidade por fraqueza muscular proximal de braços e pernas.
Paciente B	Paciente feminina, 12 anos, IMC 38, depressão com três tentativas de suicídio prévias, refere ser vítima de bullying na escola devido ao peso, sem hipertensão ou diabetes, LDL de 180, Tanner 3.
Paciente C	Paciente feminina, 32 anos, IMC de 35, diagnóstico recente de hipertensão, controlada com hidroclorotiazida, sedentária. Nunca realizou acompanhamento médico ou nutricional visando perda de peso.
Paciente D	Paciente masculino, 42 anos, IMC 52 com agenesia renal congênita à esquerda, em diálise após ferimento por arma de fogo com lesão em rim direito, obeso desde a infância com múltiplas tentativas de perda de peso prévias, apnéia obstrutiva do sono grave, candidato à transplante renal, porém com necessidade de perda de peso para diminuição de risco pré-operatório.

Dentre os pacientes listados acima, qual teria INDICAÇÃO CORRETA, para realização da cirurgia bariátrica?

- A) Apenas o paciente A.
- B) Apenas o paciente B.
- C) Apenas o paciente C.
- D) Apenas o paciente D.
- E) Nenhum dos pacientes é candidato à cirurgia.

28. Relacione o fármaco com seu mecanismo de ação:

(1) Dapagliflozina	()	Inibição do co-transportador de sódio e glicose do tipo 2
(2) Vildagliptina	()	Inibição da enzima dipeptidil dipeptidase tipo 4
(3) Glulisina	()	Agonismo ao receptor de peptídeo similar ao glucagon do tipo 1
(4) Detemir	()	Estímulo do receptor gama ativado pelo proliferador de peroxissomo

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 3 – 2 – 4.
- B) 4 – 1 – 3 – 2.
- C) 4 – 3 – 2 – 1.
- D) 1 – 2 – 4 – 3.
- E) 3 – 1 – 2 – 4.

29. A forma de hiperplasia adrenal congênita que cursa com genitália ambígua em pacientes XY e níveis reduzidos de potássio é:

- I - Deficiência de 21-hidroxilase.
- II - Deficiência de 11-beta-hidroxilase.
- III - Deficiência de 17-alfa-hidroxilase.
- IV - Deficiência de 3-beta-hidroxi-esteroide-desidrogenase.

Das afirmações acima, qual está correta?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas IV.
- E) Nenhuma das afirmações está correta.

30. Com frequência o uso de estatinas não atinge o alvo de redução de LDL em pacientes com alto risco cardiovascular, mesmo com uso de drogas de alta potência em doses elevadas. Um medicamento que pode ser adicionada ao tratamento com objetivo específico de controlar a dislipidemia é

- A) Genfibrozila.
- B) Ezetimiba.
- C) Topiramato.
- D) Exenatida.
- E) Pioglitazona.

31. Paciente feminina, 32 anos, realiza TC de abdome por sintomas de colelitíase e descobre nódulo de 1,2x0,6cm em adrenal esquerda, com atenuação de 10 Unidades Hounsfield. Nega comorbidades ou medicações de uso contínuo, mas utiliza anticoncepcional oral combinado. Quanto ao seguimento desta paciente:

- A) Mesmo que pressão arterial seja normal, é obrigatório realizar rastreamento para hiperaldosteronismo primário.
- B) A tomografia deve ser repetida anualmente por pelo menos 3 anos, pois a paciente é jovem e apresenta risco maior de neoplasia.
- C) A dosagem de metanefrinas séricas é uma opção mais conveniente do que a dosagem de metanefrinas em urina de 24 horas, porém há uma perda importante de sensibilidade.
- D) A dosagem de sulfato de desidroepiandrosterona é um exame útil para diferenciar adenomas não de adenocarcinomas adrenais, uma vez que as características de imagem costumam ser semelhantes.
- E) O uso de anticoncepcional oral aumenta a chance de rastreio falso-positivo para hipercortisolismo, através do aumento de globulina ligadora do cortisol (CBG).

32. A radiologia intervencionista pode auxiliar no diagnóstico de diversas doenças endocrinológicas. Quais afirmativas estão corretas a respeito do uso de cateterismo seletivo?

- I - O cateterismo bilateral de seio petroso é útil na investigação de síndrome de Cushing, mas não permite identificação precisa da localização da lesão, mesmo que haja lateralização importante.
- II - O cateterismo seletivo de veias adrenais é utilizado na investigação de hiperaldosteronismo primário, mas é tecnicamente desafiador devido à dificuldade de cateterizar a veia adrenal esquerda.
- III - Cateterismo de veias pancreáticas tem utilidade para definir a localização de insulinomas pequenos, não identificáveis em tomografias.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

33. O uso de fármacos antipsicóticos está relacionado com uma série de efeitos adversos indesejáveis no sistema endócrino. Dos seguintes, qual está relacionado com alterações mais marcantes no peso, metabolismo de glicose e no perfil lipídico?

- A) Haloperidol.
- B) Quetiapina.
- C) Clorpromazina.
- D) Clozapina.
- E) Risperidona.

34. Dos nódulos de tireóide abaixo, qual tem indicação de punção?

- A) Nódulo esponjiforme, isoecoico, mais largo que alto, com margem bem definida e macrocalcificações, medindo 1,7cm.
- B) Nódulo sólido, hipoecoico, mais largo que alto, com margens bem definidas, com calcificações periféricas, medindo 1,2cm.
- C) Nódulo misto, isoecoico, mais largo que alto, de margens lobuladas, sem foco ecogênico, medindo 2,7cm.
- D) Nódulo cístico, hiperecótico, mais largo que alto, de margens bem definidas, com macrocalcificações, medindo 3,7cm.
- E) Nódulo misto, hipoecótico, mais alto que largo, de margens lobuladas e calcificações periféricas, de 0,7cm.

35. A neoplasia endócrina múltipla do tipo 2A apresenta uma neoplasia maligna que está presente em quase todos os portadores desta síndrome. Esta neoplasia tem origem em que tipo de célula?

- A) Células C da tireoide.
- B) Células M da tireoide.
- C) Células da zona medular da adrenal.
- D) Células da zona glomerulosa da adrenal.
- E) Lactotrofos da hipófise.

36. Qual destes NÃO faz parte dos critérios de Rotterdam para o diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos?

- A) Hiperandrogenismo clínico.
- B) Alteração de libido.
- C) Ovários policísticos em ultrassom.
- D) Hiperandrogenismo laboratorial.
- E) Ciclos anovulatórios.

37. Os inibidores do cotransportador de sódio-glicose do tipo 2 (iSGLT2) são uma classe de medicamentos relativamente recente, com papel no tratamento do Diabetes Mellitus tipo 2. O SUS disponibiliza este medicamento, via LME, para pacientes com qual dos seguintes pré-requisitos?

- A) Idade maior que 60 anos.
- B) Nefropatia diabética com filtração glomerular >50.
- C) Uso de metformina e insulina em esquema basal+bólus.
- D) Doença cardiovascular confirmada.
- E) Neuropatia diabética estabelecida.

38. Sobre as lesões hipofisiárias, marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso:

- () Incidentalomas hipofisiários são relativamente comuns, sendo encontrados em mais de 10% das ressonâncias magnéticas, segundo alguns estudos.
- () A histologia da lesão é frequentemente compatível com a presença de adenomas secretores, sendo mais comuns o prolactinoma e o adenoma secretor TSH.
- () Durante a puberdade, a hiperplasia fisiológica da hipófise pode se assemelhar a um adenoma hipofisiário.
- () A ressecção cirúrgica transesfenoidal é a primeira opção na maioria dos casos de prolactinoma.

A ordem correta de preenchimento é:

- A) V – V – F – V.
- B) V – V – V – V.
- C) F – V – F – V.
- D) V – F – V – F.
- E) F – F – V – F.

39. Compressão de quiasma óptico por lesão supra-selar pode causar quais dos seguintes defeitos no campo visual?

- I - Hemianopsia bitemporal.
- II - Escotoma juncional de Traquair.
- III - Defeito arqueado nasal.

Estão corretas:

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

40. Qual destes exames tem utilidade para estimar reserva de células beta em um paciente diabético em uso de insulina?

- A) Proteína C.
- B) Proteína S.
- C) Insulina sérica.
- D) Peptídeo C.
- E) Anti-GAD.

41. Analise as assertivas a seguir sobre o análogo de insulina e o motivo do perfil farmacocinético, assinalando V para verdadeiro e F para falso:

- () Aspart: menor tendência à auto-associação de moléculas.
- () Glargina: maior estabilidade da molécula, dispensando adição de zinco.
- () Glulisina: diminuição do ponto isoelétrico, permitindo precipitação em pH fisiológico.
- () Detemir: circulação ligada à albumina.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo é:

- A) V – F – F – V.
- B) F – V – V – F.
- C) V – V – F – F.
- D) V – F – F – F.
- E) F – F – F – V.

42. O Diabetes Mellitus não-controlado pode causar diversas lesões em órgãos e sistemas. Marque a alternativa que descreve corretamente uma destas lesões:

- A) Retinopatia diabética é uma complicação comum, e dado seu caráter irreversível, possui o controle do diabetes como única medida preventiva ou terapêutica.
- B) Nefropatia diabética deve ser rastreada por exame de microalbuminúria, visto que a proteinúria sempre precederá a perda de filtração.
- C) O Hipoaldosteronismo hiporreninêmico é uma complicação pouco usual, decorrente de neuropatia diabética autonômica na supra-renal, e cursa com hiponatremia e hipercalemia.
- D) A eletroneuromiografia é o padrão-ouro para diagnóstico da mononeuropatia focal pelo diabetes, sendo capaz de detectar comprometimento neurológico precoce em pequenas fibras não-mielinizadas, com as responsáveis pela percepção de dor ou calor.
- E) A neuropatia autonômica implica em maior dificuldade do controle da doença, devido à alteração da resposta contra-regulatória à hipoglicemia e variabilidade glicêmica por gastroparesia.

43. Dentre as causas de diabetes monogênico encontra-se o grupo conhecido como Maturity Onset Diabetes of the Young (MODY). Uma das causas são variantes com perda de função na proteína glicoquinase, conhecido como GCK-MODY (Antigo MODY2). Qual das afirmativas a respeito desta doença está correta?

- A) Trata-se de uma doença rapidamente progressiva, sendo indicada retinografia semestral para rastreamento de complicações.
- B) Costuma estar associado a cistos renais e anormalidades do trato urinário.
- C) É bastante raro devido ao padrão de herança autossômica recessiva com penetrância incompleta.
- D) Costuma ter uma resposta excelente ao uso de sulfonilurêias, sendo esta uma ótima opção para prevenir complicações a longo prazo.
- E) Pacientes raramente tem complicações associadas, mesmo sem receber tratamento, exceto no caso de gestação associada.

44. Paciente masculino, 66 anos, DM2, dislipidêmico. LDL acima da meta, em uso de sinvastatina 40mg à noite. Para intensificação do tratamento deste paciente, qual destes medicamentos é fornecido pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul (SES/RS), mediante apresentação de LME e exames complementares?

- A) Rosuvastatina 20mg.
- B) Sinvastatina 80mg.
- C) Atorvastatina 40mg.
- D) Pravastatina 20mg.
- E) Pitavastatina 4mg.

45. A definição de amenorréia primária é:

- A) Amenorréia decorrente de lesão ovariana.
- B) Amenorréia decorrente de lesão hipofisiária.
- C) Amenorréia decorrente de disfunção hipotalâmica.
- D) Amenorréia em paciente de 16 anos ou mais.
- E) Amenorréia por mais de 6 meses, após início de ciclos menstruais regulares.

46. Em relação à leptina, podemos afirmar que:

- I - Indivíduos obesos apresentam níveis plasmáticos de leptina mais elevados do que aqueles encontrados em sujeitos magros.
- II - A leptina reduz o apetite a partir da inibição da formação de neuropeptídeos, como o neuropeptídeo Y.
- III - A leptina é produzida pelas células do estômago e sua concentração plasmática é diminuída após refeições ricas em carboidratos.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a I e II.
- C) Apenas a II e III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

47. Na investigação da síndrome de Cushing, qual o exame melhor auxilia na avaliação da etiologia?

- A) Cortisolúria de 24 horas
- B) Cortisol sérico após 1mg de dexametasona *overnight*
- C) Cortisol salivar
- D) ACTH
- E) Cortisol sérico à meia-noite

48. Em relação aos gastrinomas, podemos afirmar que:

- I- A maioria dos gastrinomas associados à Neoplasia Endócrina Múltipla tipo 1 (NEM 1) tem localização duodenal.
- II- A diarreia crônica é uma das características do excesso de secreção de gastrina.
- III- O teste de infusão endovenosa de gluconato de cálcio resulta em elevação da gastrina sérica em indivíduos com gastrinoma.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a I e II.
- C) Apenas a II e III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

49. É um efeito adverso comum do evolocumabe no tratamento da hipercolesterolemia:

- A) Nasofaringite
- B) Insuficiência renal
- C) Náuseas
- D) Rabdomiólise
- E) Rash cutâneo

50. Em indivíduo em boas condições clínicas com microadenoma de hipófise produtor de hormônio de crescimento (GH), o tratamento inicial de escolha é:

- A) Octreotida
- B) Cabergolina
- C) Cirurgia transesfenoidal
- D) Pegvisomant
- E) Bromocriptina

51. Dos peptídeos listados abaixo, qual deles tem função anorexígena?

- A) Grelina
- B) Neuropeptídeo Y (NPY)
- C) leptina
- D) MCH (Melanin-Concentrating Hormone)
- E) AgRP (Agouti-Related Peptide)

52. Entre os tumores hipofisários abaixo, o mais comumente associado ao diagnóstico de Neoplasia endócrina múltipla tipo 1 (NEM1) é o:

- A) Tumor corticotrófico
- B) Tumor hipofisário não-funcionante ACHT +
- C) Prolactinoma
- D) Tumor somatotrófico
- E) Cisto da bolsa de Rathke

53. Paciente masculino, 50 anos, previamente hígido, nega uso de medicações contínuas. Ao questionado, refere dificuldade para subir dois lances contínuos de escadas e relata sono não reparador. O pai teve IAM com 56 anos. Ao exame, bom estado geral, PA 143-87mmHg, Peso 82kg, Altura 1,64m, circunferência abdominal 105cm. Traz exames laboratoriais: glicose 99 mg/dL, colesterol total 232 mg/dL, LDLc 142 mg/dL, HDL 38 mg/dL, triglicerídeos 265 mg/dL. Considere as afirmações abaixo em relação ao caso em questão, marcando a opção INCORRETA:

- A) O paciente preenche critérios para síndrome metabólica pelos critérios ATP-III.
- B) O perfil lipídico observado é comumente encontrado nos casos de resistência insulínica.
- C) As partículas de LDLc neste paciente têm tendência a ser de maior tamanho e menos densas, sendo, portanto, mais aterogênicas.
- D) O perfil lipídico apresentado pelo paciente, principalmente ao que concerne HDL baixo, está associado a maior atividade da proteína transferidora de ésteres de colesterol (CETP).
- E) A gordura visceral, que é mais metabolicamente ativa em relação à subcutânea, é também mais sensível à ação das catecolaminas.

54. Em relação aos incidentalomas adrenais, assinale a alternativa CORRETA:

- A) Os adenomas adrenais de baixa densidade são os incidentalomas mais frequentes e geralmente têm tamanho inferior a 3 cm. É necessário seguimento dessas lesões com exame de imagem a cada 6 meses pelo risco de transformação maligna.
- B) Os mielolipomas são lesões benignas que podem surgir nas adrenais formando grandes massas. Por terem alta densidade ao exame de imagem (geralmente >20HU) devem ser distinguidas do feocromocitoma. Nos casos duvidosos, pode estar indicada a punção da lesão para análise citológica.
- C) Avaliação laboratorial dessas lesões deve incluir teste de supressão com 1mg de dexametasona overnight, coleta de catecolaminas/metanefrinas urinárias, e medida de aldosterona e atividade de renina plasmática, mesmo em pacientes assintomáticos, para excluir doença subclínica.
- D) A produção aumentada de androgênios, associada ou não a hipercortisolismo, pode indicar carcinoma adrenal, sendo o sulfato de dehidroepiandrosterona (SDHEA) o principal marcador.
- E) Lesões bilaterais devem chamar atenção para os casos de hiperplasia adrenal congênita (HAC), lesões metastáticas, tuberculose, carcinoma e doença adrenal micronodular. No caso de HAC, as lesões são sempre bilaterais.

55. No tratamento farmacológico da obesidade, o uso de associação de drogas pode ter efeito maior na perda e manutenção do peso perdido em relação ao uso de uma droga isolada. Assinale a alternativa abaixo que contém a associação de drogas que têm efeito sinérgico no sistema POMC-MC4R, aumentando sua efetividade na perda ponderal.

- A) Bupropiona + naltrexona
- B) Orlistate + fluoxetina
- C) Fluoxetina + sibutramina
- D) Topiramato + fentermina
- E) Semaglutida+ lorcaserina

56. O desenvolvimento de linhas de cuidado para pessoas com risco ou com o diagnóstico de determinadas doenças possibilita a contemplação de quais princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde:

- A) Equidade e universalidade.
- B) Gratuidade e planejamento.
- C) Integralidade e equidade.
- D) Planejamento e humanização.
- E) Universalidade e integridade.

57. Sobre a Política Nacional de Humanização do SUS (PNH), considere as afirmativas abaixo:

- I - O acolhimento refere-se ao Processo constitutivo das práticas de produção e promoção de saúde que implica responsabilização do trabalhador/equipe pelo usuário, desde a sua chegada até a sua saída.
- II - O acolhimento refere-se à organização de espaços saudáveis e acolhedores de trabalho.
- III - Por clínica ampliada, entende-se a prática interdisciplinar com a proposta de entender o significado do adoecimento e tratar a doença no contexto de vida propõe qualificar o modo de se fazer saúde.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e III.
- E) Todas estão corretas.

58. Segundo Barbara Starfield, os princípios da atenção primária à saúde (APS) são classificados em atributos essenciais e atributos derivados. Considere as afirmativas abaixo:

- I - O acesso de primeiro contato, a integralidade, a longitudinalidade e a coordenação da atenção são atributos essenciais.
- II - A orientação familiar pressupõe que a atenção à saúde seja regular e continuada com seguimento ao longo do tempo.
- III - A coordenação da atenção articula o fluxo entre os diferentes pontos da rede de atenção à saúde.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e II.
- E) Apenas a I e III.

59. O(a) _____ é uma forma de produzir saúde em que duas ou mais equipes, num processo de construção compartilhada, criam propostas de intervenção pedagógico-terapêutica.

Para que o trecho esteja correto, a lacuna deve ser preenchida por:

- A) coordenação
- B) matriciamento
- C) referenciamento
- D) co-gestão
- E) descentralização

60. Sobre medicina baseada em evidências (M.B.E.), considere:

- I - Nível de evidência A corresponde principalmente a ensaios clínicos randomizados, com controles adequados.
- II - O sistema GRADE define a forma clara e objetiva o grau de recomendação para se adotar uma determinada conduta, podendo ser forte (1) ou fraco (2).
- III - Uma evidência com nível C indica forte confiança de que o verdadeiro efeito esteja próximo daquele estimado.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e II.
- E) Todas estão corretas.

RASCUNHO