



PROVA OBJETIVA – Nível Superior
CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA - GASTROENTEROLOGIA
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS

CONCURSO PÚBLICO – Edital de Abertura nº 059/2022

ANTES DA PROVA:



**Olá! Leia as orientações
para a realização da prova conforme
o Edital de Abertura. Boa sorte!**



- * Confira seus dados na Grade de Respostas: Nome, Nº de Inscrição e Cargo. Caso haja equívoco, comunique imediatamente ao fiscal da sala.
- * Verifique se este caderno corresponde ao cargo ao qual você realizou sua inscrição e contém o número de questões conforme expresso em edital. Caso contrário, solicite a substituição do caderno.
- * Selecione APENAS UMA alternativa correta para cada questão, que contam com 5 alternativas de resposta (A, B, C, D, E).
- * Seus aparelhos eletrônicos (relógios, celulares...) devem estar acondicionados dentro do envelope de segurança fornecido, que deve ser lacrado antes de entrar na sala.

DURANTE A PROVA:



- * Preencha e assine a Grade de Respostas e a Ata de Presença, conforme o documento apresentado, utilizando caneta preta ou azul. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira, borracha, marca-texto e outros itens durante a realização da prova.
- * Preencha a Grade de Respostas marcando apenas uma alternativa para cada questão. Questões rasuradas, com mais de uma marcação ou em branco serão anuladas.
- * Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de materiais de consulta de qualquer natureza.
- * Nenhuma questão será anulada durante o período de prova. Escolha sempre uma das alternativas. Você poderá solicitar Recurso Administrativo sobre o gabarito preliminar, conforme datas do cronograma de execução.
- * Fique atento ao tempo de realização da prova, incluindo o preenchimento da Grade de Respostas conforme orientação apresentada na sala.

APÓS A PROVA:



- * Você poderá levar consigo o Caderno de Questões após 02 (duas) horas do início da prova.
- * Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal da sala, aguardando a autorização para entregar a Grade de Respostas.
- * Os dois últimos candidatos devem permanecer em sala a fim de assinar o termo de encerramento das atividades da sala.
- * O gabarito preliminar será divulgado conforme o cronograma de execução deste edital.



Direitos autorais reservados à Fundação La Salle.
Proibida Reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

Acesse o site:
www.fundacaolasalle.org.br/concursos
ou utilize o QR code ao lado.



LÍNGUA PORTUGUESA

As questões de número 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

A geração Covid: o impacto da pandemia no desenvolvimento das crianças

01 A conta chegou! Como era de esperar, a pandemia deixou cicatrizes no
02 desenvolvimento dos nossos filhos. É o que documentam os primeiros estudos sobre a
03 chamada Geração Covid, aquela que nasceu ou cresceu durante o período de restrições
04 desencadeadas pelo coronavírus.

05 Com o isolamento social e uma rotina distante de outras crianças e da escola, boa parte
06 dos pequenos teve experiências limitadas numa etapa da vida marcada por descobertas e a
07 exploração do mundo. O universo ficou confinado ___ paredes de casa, a interação com os
08 outros encolheu e o acesso __ educação e às opções de lazer também saiu prejudicado.

09 Já dava para antever os efeitos desse cenário conturbado no desenvolvimento físico,
10 _____ e emocional dos mais novos. E, de fato, a ciência desnuda agora as consequências.

11 Uma pesquisa da Universidade Colúmbia, nos Estados Unidos, comparou a evolução
12 esperada de bebês de 6 meses nascidos antes e durante a pandemia. Resultado: os
13 especialistas notaram que os pequenos que _____ ao mundo em meio ao isolamento
14 tiveram pontuações mais baixas no desenvolvimento motor — importante para virar sozinho de
15 barriga pra baixo e pegar um brinquedo com as mãos, por exemplo — e socioemocional, aquele
16 que molda o convívio com pessoas fora do círculo familiar.

17 Para a psicóloga Maria Beatriz Martins Linhares, professora sênior da Faculdade de
18 Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP), esses achados eram
19 previstos. “A primeira infância é a fase em que a arquitetura cerebral está pulsante, é o momento
20 ideal para aprender e ganhar habilidades básicas para a trajetória do desenvolvimento humano”,
21 justifica. É nessa janela temporal que o contato com a natureza e os outros, as brincadeiras ao
22 ar livre e a vivência de desafios estimulam o cérebro e _____ o corpo crescer com saúde.

23 Tudo isso foi podado entre os filhos da pandemia. “A restrição das atividades nos
24 primeiros anos de vida claramente impacta no curto, no médio e no longo prazo. A área do
25 cérebro ligada __ integração social fica comprometida, bem como as habilidades cognitivas e
26 as relacionadas ao planejamento motor”, resume a neuropediatra Liubiana Arantes, presidente
27 do Departamento de Pediatria do Desenvolvimento da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

28 As descobertas do estudo de Colúmbia, e de tantos outros tocados pelo globo, tornam
29 mais palpável a angústia dos pais dessa geração. _____ daqueles que começaram a
30 desconfiar de atrasos no aprendizado de tarefas como engatinhar, andar e falar.

31 A saúde mental também não passou em branco — mesmo entre os novinhos de tudo.
32 No Brasil, um estudo conduzido pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e a
33 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apontou um crescimento significativo no número
34 de bebês que, aos 6 meses, apresentavam irritabilidade e dificuldades de adaptação à rotina.

35 “Sabemos que a pandemia aumentou a sobrecarga dos pais, e esses comportamentos
36 infantis podem ser entendidos como um reflexo do estresse parental, do uso frequente de telas
37 ou mesmo da falha em compreender e atender as demandas das crianças”, analisa __ pediatra
38 Claudia Lindgren Alves, professora da UFMG e coordenadora do trabalho.

39 Segundo Maria Beatriz, o estresse crônico, em todos os sentidos, deve ser encarado
40 como um fator de risco para o desenvolvimento infantil. “A chance de haver impactos negativos
41 em um cenário estressor é sempre potencializada”, afirma a psicóloga e docente da USP.

Disponível em < <https://saude.abril.com.br/familia/a-geracao-covid-o-impacto-da-pandemia-no-desenvolvimento-das-criancas/> > (adaptado).

01. Considerando o emprego do sinal indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 07, 08, 25 e 37.

- A) as – à – à – a.
- B) às – a – à – a.
- C) às – à – à – a.
- D) às – à – à – à.
- E) as – à – a – a.

02. Considerado a ortografia vigente, as lacunas das linhas 10, 13, 22 e 29 devem ser, respectivamente, preenchidas por

- A) psíquico – chegaram – fazem – Sobre tudo.
- B) psíquico – chegaram – fazem – Sobretudo.
- C) písíquico – chegarão – faz – Sobretudo.
- D) pissíquico – chegarão – faz – Sobretudo.
- E) písíquico – chegaram – faz – Sobre tudo.

03. Sobre as palavras “psicóloga” e “achados”, avalie as afirmações abaixo e assinale (V) para Verdadeiro e (F) para Falso.

- () Ambas são paroxítonas.
- () Ambas possuem hiato.
- () Somente a segunda possui dígrafo.
- () A primeira possui tritongo.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V – V.
- B) V – F – V – F.
- C) F – F – F – F.
- D) V – V – F – V.
- E) F – F – V – F.

04. Na linha 01, o verbo “deixou”, no contexto em que se encontra, é

- A) intransitivo.
- B) transitivo direto.
- C) transitivo indireto.
- D) transitivo direto e indireto.
- E) de ligação.

05. Analise as afirmativas abaixo.

- I - Na linha 07, o termo “O universo”, no contexto em que se encontra, é o sujeito da oração.
- II - Na linha 12, o termo “a”, no contexto em que se encontra, é adjunto adnominal.
- III - Na linha 31, o termo “saúde”, no contexto em que se encontra, é o núcleo do sujeito composto.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

06. Com base no texto, analise as afirmativas abaixo.

- I - O texto ratifica que a pandemia trouxe malefícios para as crianças.
- II - Maria Beatriz Linhares não concorda com os resultados obtidos pela pesquisa da Universidade Colúmbia.
- III - Somente a Universidade Colúmbia realizou estudos sobre o assunto abordado no texto.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

07. Analise o trecho a seguir:

“Com o isolamento social e uma rotina distante de outras crianças e da escola, boa parte dos pequenos teve experiências limitadas numa etapa da vida marcada por descobertas e a exploração do mundo.”

Ao trocarmos a expressão “boa parte dos pequenos” por “os pequenos”, quantas palavras sofreriam, obrigatoriamente, alteração para fins de concordância?

- A) Uma
- B) Duas
- C) Três
- D) Quatro
- E) Cinco

08. Em “As descobertas do estudo de Colúmbia, e de tantos outros tocados pelo globo, tornam mais palpável a angústia dos pais dessa geração.” é correto afirmar que há,

- A) conjunção alternativa e interjeição.
- B) advérbio e artigo indefinido.
- C) pronome possessivo e conjunção alternativa.
- D) artigo indefinido e preposição essencial.
- E) artigo definido e preposição essencial.

09. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

(1) Verbo pertencente à primeira conjugação.	() Chegou
(2) Verbo pertencente à segunda conjugação.	() Impacta
(3) Verbo pertencente à terceira conjugação.	() Sabemos
	() Saiu

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- A) 1 – 1 – 2 – 3.
- B) 1 – 1 – 3 – 2.
- C) 3 – 3 – 1 – 3.
- D) 2 – 3 – 1 – 2.
- E) 1 – 3 – 2 – 1.

10. Observe as seguintes perguntas:

- I – Quantos bebês participaram da pesquisa realizada pela Universidade Colúmbia?
- II – Qual o cargo de Liubiana Arantes na Sociedade Brasileira de Pediatria?
- III – Quem faz parte da Geração Covid?

Das perguntas acima, qual(is) é(são) respondida(s) pelo texto?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

LEGISLAÇÃO

11. No que tange à Lei de Improbidade Administrativa, da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública caberá:

- A) Mandado de segurança.
- B) Apelação.
- C) Agravo de instrumento.
- D) Recurso ordinário.
- E) Recurso extraordinário.

12. No que tange ao Estatuto do Idoso, relativamente ao seu direito à saúde, marque a alternativa INCORRETA:

- A) Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 (oitenta) anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência.
- B) À pessoa idosa que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável.
- C) À pessoa idosa internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico.
- D) É vedada a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.
- E) O idoso que não esteja no pleno gozo de suas faculdades mentais, incapaz de optar pela realização de tratamento de saúde, deverá ser encaminhado por seu médico quando ocorrer iminente risco de morte, independente de notificação a familiares ou ao Ministério Público, em razão do estado de necessidade do paciente.

13. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, são requisitos para a concessão de pedidos de colocação em família substituta, EXCETO:

- A) Qualificação completa do requerente e de seu eventual cônjuge, ou companheiro, com expressa anuência deste.
- B) Certidão do trânsito em julgado da sentença penal condenatória que destituiu o poder familiar dos pais biológicos.
- C) Declaração sobre a existência de bens, direitos ou rendimentos relativos à criança ou ao adolescente.
- D) Indicação de eventual parentesco do requerente e de seu cônjuge, ou companheiro, com a criança ou adolescente, especificando se tem ou não parente vivo.
- E) Indicação do cartório onde foi inscrito nascimento, anexando, se possível, uma cópia da respectiva certidão.

14. No que concerne à Lei Maria da Penha, marque a alternativa CORRETA:

- A) Os crimes praticados contra a mulher serão julgados pelos Juizados Especiais Criminais, previstos na Lei nº 9099/95.
- B) Os delitos punidos na Lei Maria da Penha são de ação penal pública incondicionada, isto é, independem da vontade da vítima quando do oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.
- C) Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, sem exceções.
- D) Como medida protetiva de distanciamento do agressor em relação à vítima, os juízes, por força de previsão na Lei, fixam o mínimo de 200 (duzentos) metros entre os envolvidos.
- E) Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

15. Os servidores da Secretaria Municipal de Saúde e Serviço Social em atividades em creches e unidades sanitárias terão uma gratificação correspondente a:

- A) 20% (vinte por cento) do valor líquido do respectivo cargo, sobre o qual incidem gratificações.
- B) 20% (vinte por cento) do valor básico inicial do respectivo cargo, sem a incidência de vantagens.
- C) 25% (vinte e cinco por cento) do valor básico inicial do respectivo cargo, sobre o qual não incidirão quaisquer gratificações ou vantagens.
- D) 25% (vinte e cinco por cento) do valor bruto do respectivo cargo, sobre o qual incidem gratificações.
- E) 30% (trinta por cento) do valor básico inicial do respectivo cargo, sobre o qual não incidirão quaisquer gratificações ou vantagens.

16. Dos direitos à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana e ao esporte e lazer NÃO compreendem:

- A) A produção, a comercialização, a aquisição e o uso de artigos e materiais religiosos adequados aos costumes e às práticas fundadas na respectiva religiosidade, ressalvadas as condutas vedadas por legislação específica.
- B) A comunicação ao Ministério Público para abertura de ação penal em face de atitudes e práticas de intolerância religiosa nos meios de comunicação e em quaisquer outros locais.
- C) A assistência religiosa aos praticantes de religiões de matrizes africanas internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, excluindo-se àqueles submetidos a pena privativa de liberdade.
- D) A capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional, nos termos da Lei Maior.
- E) É facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas pelos capoeiristas e mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos.

17. Segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Porto Alegre, relativamente ao aproveitamento é INCORRETO afirmar que:

- A) No aproveitamento, terá preferência o que estiver a mais tempo em disponibilidade e, no caso de empate, o que contar mais tempo de serviço público municipal
- B) O funcionário que, no prazo de trinta dias, não entrar em exercício será considerado em abandono do cargo.
- C) O aproveitamento dependerá de prova de capacidade física e mental, mediante perícia médica.
- D) Em casos de aproveitamento, provada em perícia médica a incapacidade definitiva para o serviço público em geral, o funcionário será aposentado.
- E) O funcionário não poderá ser aproveitado a pedido em cargo de natureza diversa daquele de que era titular.

18. No que concerne ao direito à cultura, à educação, ao esporte e ao lazer, pelo Estatuto Estadual da Igualdade Racial, o Estado deverá promover políticas que valorizem a cultura por exemplo:

- A) Do *hip hop*, do *rap* e do *funk*.
- B) Do *hip hop*, do *brake dance* e do *blues*.
- C) Do *rap* e da pintura de grafite.
- D) Do *brake dance* e do *funk*.
- E) Do *hip hop* e do sertanejo universitário.

19. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, segundo a Constituição Federal, é de competência:

- A) Exclusiva dos municípios.
- B) Privativa dos Estados.
- C) Privativa da União e do Distrito Federal.
- D) Comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- E) Comum dos Estados e municípios, apenas.

20. De acordo com expressa previsão da Lei complementar 478/2002, NÃO são consideradas acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho:

- I - a doença degenerativa.
- II - a inerente a grupo etário.
- III - a que não produza incapacidade laborativa.
- IV - a síndrome do pânico e a síndrome de *burnout*.

Das assertivas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas I, II e III.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e IV.
- E) Apenas IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Paciente do sexo feminino, 23 anos, apresenta-se com diarreia e emagrecimento de 3kg há 1 ano. Tem diabetes tipo I e dermatite herpetiforme. Ao exame físico apresenta-se hipocorada. Qual a mais provável causa da diarreia?

- A) Síndrome do intestino irritável.
- B) Intolerância à lactose.
- C) Doença de Crohn.
- D) Enteropatia do glúten.
- E) Hipertireoidismo.

22. A realização de biópsia endoscópica para avaliação histopatológica é fundamental para o diagnóstico de quais patologias?

- A) Esôfago de Barrett e esofagite eosinofílica.
- B) Doença celíaca e úlcera duodenal.
- C) Esofagite erosiva e dispepsia funcional.
- D) Doença de Crohn e intolerância à lactose.
- E) Gastropatia portal hipertensiva e acalasia.

23. Em relação às úlceras pépticas, qual afirmativa está correta?

- A) Houve redução da incidência de úlcera péptica nas últimas décadas.
- B) Houve redução das taxas de mortalidade por úlcera péptica nas últimas décadas.
- C) Em caso de infecção por *Helicobacter pylori*, esta bactéria deve ser erradicada, sendo que o risco de reinfecção após terapia de erradicação é alto.
- D) Podemos conferir a erradicação do *Helicobacter pylori* através de método não invasivo, como teste sorológico, a ser realizado 8 semanas após o tratamento.
- E) A infecção por *Helicobacter pylori* é a principal causa de úlcera duodenal, enquanto a o uso de AINE é a principal causa de úlcera gástrica.

24. Paciente do sexo feminino, 35 anos, consulta por apresentar-se há 12 dias com diarreia líquida até 6x/dia, dor em abdome inferior em cólica e febrícula de até 37,6°C. Tem histórico de constipação há mais de 10 anos. Há 15 dias realizou tratamento para sinusite com amoxicilina-clavulanato. Teve úlcera duodenal aos 25 anos. Não fuma e não ingere bebidas alcoólicas. Ao exame físico: T° axilar = 37,0°C, abdome com leve sensibilidade à palpação no quadrante inferior esquerdo, sem defesa. Exames laboratoriais mostram contagem de leucócitos 15.000/mcL. Qual patologia devemos suspeitar?
- A) Parasitose intestinal.
 - B) Diverticulite aguda.
 - C) Colite por Clostridium Difficile.
 - D) Doença celíaca.
 - E) Doença de Crohn.
25. Homem de 68 anos é trazido ao pronto-socorro por apresentar-se há 4 dias com mal-estar, náuseas e vômitos, sendo que há 2 dias iniciou com confusão mental progressiva e letargia. O paciente tem hipertensão e lombalgia crônica. Faz uso de captopril 25mg 12/12h e da associação codeína 30mg-Acetaminofeno 500mg 1 a 2x/dia. Vem com dor de dente há 1 semana e está usando Acetaminofeno 750mg 6/6h. O paciente fuma um maço de cigarros e bebe 2 doses de uísque diariamente. Ao exame físico: PA=110/60mmHg, FC=108/min, IMC=32 kg/m², sonolento, obedece comandos verbais, presença de asterix, icterícia leve, exame cardiopulmonar normal, hepatimetria 15cm em linha hemiclavicular direita, borda hepática lisa e levemente dolorosa à palpação. Exames laboratoriais mostram hematócrito 42%, plaquetas 160.000/mm³, leucócitos 9000/mm³, creatinina 1,9 mg/dL, bilirrubina total 3,3 mg/dL, fosfatase alcalina 220 U/L, AST 3207 U/L, ALT 4180 U/L, INR 1,6. Qual a principal hipótese diagnóstica?
- A) Hepatite alcoólica aguda.
 - B) Hepatite C crônica.
 - C) Hepatite isquêmica.
 - D) Cirrose hepática.
 - E) Lesão hepática induzida por medicação.
26. Uma mulher de 82 anos foi atendida por apresentar-se há 2 dias com intensa náusea e anorexia. Há 1 mês vem com episódios de dor abdominal de moderada intensidade e vômitos, que persistem por poucas horas, mas não teve dor nos últimos 2 dias. Tem diabetes tipo 2, hipertensão, prolapso da válvula mitral, osteoartrite, cálculos biliares e constipação. Esteve hospitalizada por diverticulite há 2 anos. Ao exame físico: corada, anictérica, T°axilar 37,2° C, PA=108/68mmHg, FC=106/bpm, FR=20mrpm, IMC 38kg/m², RHA aumentados, abdome flácido e indolor. Exames laboratoriais mostram leucócitos 11.000/mm³, AST 50, ALT 48. Radiografia abdominal mostra alças do intestino delgado dilatadas e presença de ar nos ductos biliares intra-hepáticos. Qual é a causa mais provável dos sintomas desta paciente?
- A) Isquemia intestinal aguda.
 - B) Diverticulite aguda.
 - C) Obstrução intestinal mecânica.
 - D) Colecistite enfisematosa.
 - E) Perfuração de úlcera péptica.
27. Um paciente de 50 anos foi submetido a colonoscopia de rastreamento e foi identificado um pólipó sésil, medindo 7 mm, situado no ceco. Foi realizado sua completa ressecção em um único fragmento durante o procedimento e a avaliação histopatológica mostrou tratar-se de adenoma viloso com displasia de baixo grau. Qual é o esquema de vigilância recomendado?
- A) Colectomia.
 - B) Repetir a colonoscopia em 3-4 meses.
 - C) Repetir a colonoscopia em 12 meses.
 - D) Repetir a colonoscopia em 3 anos.
 - E) Repetir a colonoscopia em 7-10 anos.

28. Um homem de 53 anos chega ao consultório referindo emagrecimento de 7kg nos últimos 12 meses e apresentar-se há 6 meses com dor intermitente e intensa em abdome superior, associada a náusea e diarreia (fezes volumosas, com odor forte e que flutuam na água). Os episódios geralmente ocorrem 15 a 30 minutos após as refeições e duram poucas horas. A dor não é aliviada com antiácidos, mas melhora quando se inclina para a frente. Teve outros episódios prévios de dor em abdome superior, de curta duração, ao longo dos últimos 3 anos. Nega outros problemas médicos e não toma medicamentos. O paciente fuma um maço de cigarros por dia e consome 4 latas de cerveja quase diariamente há mais de 20 anos. Tem história familiar de diabetes tipo 2 (mãe) e de câncer de próstata (pai). Qual o exame mais indicado para este paciente?

- A) Anticorpos antitransglutaminase tecidual.
- B) CA 19-9.
- C) Tomografia computadorizada de abdome.
- D) Níveis de lipase sérica.
- E) Endoscopia digestiva alta.

29. Um homem de 54 anos é levado ao pronto-socorro após um episódio de hematêmese e tontura. Ele tem cirrose hepática por hepatite C crônica, sem tratamento. Ao exame físico: hipocorado, icterico, PA=105/60mmHg, FC=110 bpm e FR=16mrpm, abdome distendido e com macicez móvel. Exames laboratoriais mostram: hemoglobina 10,2g/dL, leucócitos 9.500/mm³, plaquetas 72.000/mm³, sódio 140mEq/L, potássio 3,5mEq/L, creatinina 0,8mg/dL, INR 1,8. O paciente começa a receber reposição volêmica com solução salina e é administrado ceftriaxona. Qual seria o próximo passo mais apropriado no manejo deste paciente?

- A) Infusão de albumina.
- B) Infusão de Octreotide.
- C) Transfusão de hemácias.
- D) Transfusão de plaquetas.
- E) Tamponamento com balão de Sengstaken-Biakemore.

30. Uma mulher de 65 anos apresentou 3 episódios de enterorragia volumosa, evacuando sangue de coloração escurecida nas últimas 2 semanas. O paciente não apresenta dor abdominal, náusea ou vômito. Ela tem história de hipertensão, diabetes tipo 2, dislipidemia e estenose aórtica. Ao exame físico: T° axilar=36,7°, PA=140/80mmHg, FC=95bpm. Os exames laboratoriais mostram hemoglobina 11,1g/dL, creatinina 1,6. Colonoscopia realizada há 6 meses foi normal, mas a avaliação do cólon ascendente foi prejudicada pela presença de líquido opaco e pequena quantidade de resíduos fecais. Qual a mais provável causa do sangramento?

- A) Angiodisplasia.
- B) Câncer de colon.
- C) Diverticulose.
- D) Hemorroidas.
- E) Colite isquêmica.

31. Paciente do sexo feminino, de 25 anos, iniciou há 1 mês com episódios de pirose e de regurgitação ácida após refeições, ocorrendo cerca de 2x/semana. Refere piora dos hábitos alimentares e aumento progressivo de peso (4kg) desde que mudou de emprego há 6 meses. Qual a melhor conduta a ser tomada neste caso?

- A) Realizar endoscopia digestiva alta.
- B) Realizar pHmetria e manometria esofágica.
- C) Realizar estudo contrastado do esôfago.
- D) Realizar tomografia de abdome.
- E) Iniciar tratamento para doença do refluxo gastro-esofágico.

32. Em relação ao Esôfago de Barrett, assinale a alternativa correta:

- A) O diagnóstico de esôfago de Barrett é definido pelos achados endoscópicos específicos, e a realização de biópsias está indicada em caso de lesão sugestiva de neoplasia.
- B) O potencial de malignidade aumenta quanto maior for a maior extensão do esôfago de Barrett.
- C) Esôfago de Barrett segmento curto não necessita de tratamento.
- D) O tratamento com inibidores de bomba de prótons é ineficaz a longo prazo.
- E) A Taxa de progressão anual do esôfago de Barrett sem displasia para adenocarcinoma é de 5%, sendo indicado endoscopia anual para acompanhamento.

33. Nos casos de retocolite ulcerativa, assinale a alternativa correta:

- A) Os pacientes têm risco aumentado de câncer colorretal e de colangite esclerosante primária.
- B) Uma vez que seja necessário realizar proctocolectomia total, esta conduta não pode ser considerada um procedimento curativo.
- C) Prednisona está entre as principais opções terapêuticas para uso prolongado.
- D) Azatioprina tem sua maior indicação de uso no tratamento das exacerbações na fase aguda.
- E) Metronidazol e Ciprofloxacina tem como sua principal indicação o tratamento de fístulas e fissuras perianais da retocolite ulcerativa.

34. Um homem de 45 anos se apresenta para um check-up de rotina. Ele diz que se sente "perfeitamente saudável" e não tem queixas. Tem história pessoal de fratura na clavícula por jogar futebol no ensino médio. Ele é advogado, monogâmico e vive com sua esposa e dois filhos. Exames laboratoriais mostram hemoglobina 13,8 g/L, VCM 103 fl, plaquetas 290.000/mm³, AST 195 U/L, ALT 90 U/L, glicemia 95 mg/dL. Qual a primeira conduta a ser tomada?

- A) Solicitar marcadores virais para hepatite.
- B) Solicitar ecografia abdominal.
- C) Solicitar níveis de cobre urinário, cobre sérico e ceruloplasmina.
- D) Solicitar níveis séricos de ferro e ferritina.
- E) Obter mais histórico sobre o consumo de álcool ou drogas.

35. Uma mulher de 44 anos chega ao pronto-socorro com dor epigástrica intensa, com irradiação para dorso e associada com náuseas e vômitos. A dor teve início súbito e permaneceu estável nas últimas horas. Na história médica pregressa refere cirurgia por hérnia femoral aos 30 anos e apendicectomia na infância. A paciente não toma medicamentos, não fuma e não ingere bebidas alcoólicas. Ao exame físico: paciente agitada, sentada inclinada para a frente na cama, T°axilar= 37,2° C , PA= 110/70 mmHg, FC=98bpm, FR=18mrpm,IMC 35kg/m², exame cardiopulmonar normal, apresenta sensibilidade moderada no epigástrio, sem sinais de irritação peritoneal. Exames laboratoriais mostram: hemoglobina 12,6g/L, plaquetas 340.000/mm³, leucócitos 14.100/mm³, albumina 4,8g/dL, bilirrubina total 1,0mg/dL, fosfatase alcalina 271 U/L, AST 133U/L, ALT 172U/L, amilase 2610U/L, lipase 3880U/L, triglicerídeos 110 mg/dL, cálcio 8,9mg/dL. Qual das seguintes condutas seria o melhor próximo passo na avaliação da etiologia da condição aguda desta paciente?

- A) Tomografia computadorizada abdominal.
- B) Cintilografia hepática.
- C) Radiografia abdominal.
- D) Ecografia abdominal.
- E) Marcadores virais para hepatite.

36. Em relação ao carcinoma de células escamosas do esôfago, é correto afirmar que:

- A) Está associado com doença do refluxo gastroesofágico e Esôfago de Barrett.
- B) É mais frequente antes dos 50 anos e está associado a um nível socioeconômico mais elevado.
- C) Os pacientes com câncer de cabeça e pescoço têm um risco aumentado de câncer de células escamosas do esôfago.
- D) A exposição a bebidas quentes, a longo prazo, tem fator protetor contra este câncer.
- E) São tumores que surgem predominantemente no esôfago distal, em associação com tabagismo e consumo de bebidas alcoólicas.

37. Uma mulher de 60 anos com hepatite C crônica e cirrose Child-Pugh B é hospitalizada por pneumonia e é iniciado tratamento com ceftriaxona. Tem osteoartrite e está em uso de Ibuprofeno. No segundo dia de hospitalização, os exames laboratoriais mostram creatinina sérica 1,5 mg/dL, INR 1,4, bilirrubina total 3 mg/dL e albumina sérica 2,9 g/dL. As enzimas hepáticas permanecem estáveis. A TFG é de 38 mL/min/1,73 m². Ela não tem evidência de encefalopatia hepática. Nesta situação clínica, qual a afirmação correta?

- A) A Ceftriaxona deve ser descontinuada.
- B) O Ibuprofeno deve ser descontinuado.
- C) A ceftriaxona e o Ibuprofeno devem ser descontinuados.
- D) Manter uso de Ceftriaxona e Ibuprofeno, e associar uso de diurético.
- E) Manter uso de Ceftriaxona e Ibuprofeno, e associar tratamento com albumina e terlipressina.

38. Quanto à infecção pelo *Helicobacter pylori*, é correto afirmar que:

- A) A infecção pelo *Helicobacter pylori* é o principal fator de risco para o adenocarcinoma gástrico, tanto do tipo intestinal quanto do tipo difuso de Lauren.
- B) A colonização gástrica pelo *Helicobacter pylori* depende da motilidade da bactéria e da sua capacidade para produzir urease.
- C) As taxas de infecção pelo *Helicobacter pylori* vêm aumentando nas últimas décadas, especialmente entre os jovens.
- D) A bactéria produz fatores de superfície quimiotático para neutrófilos e monócitos, que contribuem para proteger as células epiteliais gástricas.
- E) A bactéria, inicialmente, se estabelece em corpo gástrico.

39. Um paciente de 21 anos procura atendimento médico por apresentar-se com hematoquezia há vários meses. Ele é adotado e sua história familiar é desconhecida. Seus sinais vitais estão estáveis. Os exames laboratoriais revelam hemoglobina 9,0 g/dl. Foi realizado colonoscopia que mostrou centenas de pólipos colônicos. A avaliação histopatológica de biópsias dos pólipos mostrou serem pólipos adenomatosos. Qual é a recomendação apropriada para este paciente neste momento?

- A) Tranquilizar o paciente, pois os pólipos são benignos e com baixo risco de malignização.
- B) Realizar colonoscopia com biópsia a cada três anos.
- C) Repetir colonoscopia com biópsia em oito anos.
- D) Indicar proctocolectomia eletiva.
- E) Realizar vigilância cuidadosa com pesquisa de sangue oculto nas fezes e CEA anualmente.

40. Um homem de 34 anos chega ao consultório com história de diarreia há 4 semanas, associado com dor abdominal em cólica e distensão abdominal, com início durante uma viagem de motocicleta pela América Latina. Ele não tem sangue nas fezes. Há 1 semana usou Ciprofloxacina por 3 dias, sem melhora dos sintomas. Ele não tem outros problemas de saúde e nunca teve sintomas semelhantes. Nega tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas e uso de drogas. Ao exame físico: T° axilar=36,8°C, PA=126/80mmHg, FC= 86bpm, RHA aumentados e abdome indolor à palpação. Qual seria a conduta mais adequada?

- A) Ciprofloxacina por mais 5 dias.
- B) Colonoscopia com biópsia de mucosa.
- C) Tomografia computadorizada de abdome.
- D) Teste de antígeno fecal para *Clostridium difficile*.
- E) Exame parasitológico de fezes.

41. Sobre o uso de exames complementares na pancreatite aguda, considere as afirmações abaixo:

- I- Para o diagnóstico, há a necessidade de elevação nas enzimas lipase e amilase.
- II- Um aumento de 2 vezes o valor máximo de referência da amilase confirma o diagnóstico de pancreatite aguda.
- III- A elevação apenas da lipase pode indicar pancreatite, sendo um marcador com tempo de meia-vida mais prolongado do que a amilase.

Das afirmações acima, qual(ais) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e II.
- E) Apenas a II e III.

42. A realização do exame de biópsia hepática é uma opção na avaliação para a terapêutica dos pacientes com hepatites virais. Numa situação na qual a doença hepática está compensada e a atividade de protrombina está adequada, qual o menor valor adequado na contagem de plaquetas sanguíneas permite realizar o procedimento:

- A) > 60.000/mm³;
- B) > 30.000/mm³
- C) > 40.000/mm³
- D) > 10.000/mm³
- E) > 200.000/mm³

43. Ao se diagnosticar um caso de pancreatite leve, quais são as condutas adequadas para o primeiro dia de hospitalização:

- I – Jejum.
- II – Hidratação endovenosa com cristaloides e analgesia.
- III – Tomografia computadorizada com contraste.

Das afirmativas acima, qual(ais) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e II.
- E) Apenas a II e III.

44. O diagnóstico e a interpretação de exames relacionados à Hepatite B fazem parte da rotina do médico gastroenterologista. Sobre o exame HbeAg (antígeno “e” do vírus da Hepatite B), marque a alternativa correta:

- A) É o primeiro marcador a surgir após a infecção pelo HBV, em torno de 30 a 45 dias, podendo permanecer detectável por até 120 dias. Está presente nas infecções agudas e crônicas.
- B) É um marcador que indica contato prévio com o vírus. Permanece detectável por toda a vida nos indivíduos que tiveram a infecção (mesmo naqueles que não cronicaram, ou seja, eliminaram o vírus).
- C) É um marcador de infecção recente, portanto confirma o diagnóstico de hepatite B aguda. Pode persistir por até 6 meses após o início da infecção.
- D) É indicativo de replicação viral e, portanto, de alta infectividade. Está presente na fase aguda, surge após o aparecimento do hbsag e pode permanecer por até 10 semanas. Na hepatite crônica pelo HBV, a presença do hbeag indica replicação viral e atividade da doença (maior probabilidade de evolução para cirrose).
- E) É marcador relacionado ao sucesso da imunização.

45. Sobre o curso e o prognóstico em casos de hepatite B, considere as afirmativas:

- I – A hepatite aguda B normalmente tem bom prognóstico: o indivíduo resolve a infecção e fica livre dos vírus em cerca de 90% a 95% dos casos.
- II – A evolução para infecção crônica, por sua vez, ocorre em menor proporção – e é definida como a persistência do vírus ou a presença do HBsAg por mais de seis meses, detectada por meio de testes sorológicos.
- III – Na fase imunorreativa, a tolerância imunológica esgota-se diante da incapacidade do sistema imune de eliminar o vírus. É caracterizada pelo teste HBeAg reagente e por menores índices de HBV-DNA sérico, indicativo de menor replicação viral; ela termina com a soroconversão para anti-HBe.

Das afirmativas acima, qual(ais) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e II.
- E) Todas estão corretas.

46. A polifarmácia e a multimorbidade são frequentes em pessoas com doenças crônicas, em especial as idosas. Nesse contexto, a prescrição e as condutas em gastroenterologia devem estar de acordo com os riscos inerentes a tais condições. Em paciente com alto risco para desenvolvimento de úlceras gástricas, com a indicação do uso a longo prazo de antiinflamatórios não-esteroidais (AINES), antiagregantes plaquetários ou anticoagulantes orais, qual conduta está mais adequada:

- A) Pesquisa e erradicação do H. pylori.
- B) Associação profilática com pantoprazol exclusivamente.
- C) Desaconselhamento quanto ao uso desses fármacos.
- D) Prescrição de bismuto profilático.
- E) Associação de ranitidina e omeprazol de maneira continuada.

47. A infecção pelo *Helicobacter pylori* (HP) é prevalente em nosso meio. Sobre o diagnóstico, considere as seguintes afirmativas:

- I – O teste respiratório com ureia ¹³C é o método padrão-ouro para o diagnóstico não invasivo da infecção por HP.
- II – Para o estudo do HP usando o teste rápido da urease (TRU), recomenda-se a coleta de um fragmento do antro e um do corpo
- III – O teste rápido da urease (TRU) sozinho é recomendado para controle da terapia de erradicação.

Das afirmativas acima, qual(ais) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a I e II.
- D) Apenas a II e III.
- E) Apenas a I e III.

48. O paciente é encaminhado ao gastroenterologista com resultado de endoscopia e de exame anatomopatológico coletado no procedimento. O paciente havia procurado a atenção primária com queixa de dispepsia havia 2 meses. Nega alergias medicamentosas ou tratamento prévio para a queixa. Considere as afirmativas:

- I - A duração da terapia de erradicação do HP deve ser de 7 dias, especialmente para a terapia tripla padrão, afim de alcançar uma alta taxa de erradicação.
- II - Em casos de úlcera gástrica ou úlceras gastroduodenais complicadas, tratamento com IBPs por 4 a 8 semanas após a terapia de erradicação é recomendada.
- III - Em casos de falha à terapia tripla com Claritromicina ou à terapia quádrupla concomitante, as estratégias recomendadas são terapia tripla com Levofloxacina ou terapia quádrupla com Bismuto, ambas por 10 a 14 dias.

Das afirmativas acima, qual(ais) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e II.
- E) Apenas a II e III.

49. Um paciente de 55 anos, sexo masculino, traz resultado de colonoscopia de rastreamento solicitada recentemente. Nega histórico familiar de neoplasia colorretal ou de polipose adenomatosa familiar. Está assintomática. O exame mostrou que foram retirados 6 adenomas, o maior com 0,9 cm. Qual a periodicidade para nova colonoscopia?

- A) 6 meses.
- B) 1 ano.
- C) 3 anos.
- D) 5 anos.
- E) 10 anos.

50. Cada vez mais, o método clínico centrado na pessoa (MCCP) é reconhecido como um parâmetro importante de qualidade assistencial. Quais são os resultados esperados na aplicação dessa forma de abordagem clínica?

- I - Maior satisfação das pessoas e médicos.
- II - Diminuição na utilização dos serviços de saúde.
- III - Diminuição das queixas por má-prática.
- IV - Melhora na situação fisiológica e na recuperação de problemas recorrentes.

Das afirmativas acima, quais estão corretas?

- A) Apenas a I e II.
- B) Apenas a III e IV.
- C) Apenas a I e III.
- D) Apenas a II e IV.
- E) Todos estão corretas.

51. O Capítulo I do Código de Ética Médica (CEM) traz os princípios que regem a atuação do médico. Considere as afirmativas:

- I - A medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e será exercida sem discriminação de nenhuma natureza.
- II - Para exercer a medicina com honra e dignidade, o médico necessita ter boas condições de trabalho e ser remunerado de forma justa.
- III - O médico, caso assim deseje, poderá comunicar às autoridades competentes quaisquer formas de deterioração do ecossistema, prejudiciais à saúde e à vida.
- IV - O médico empenhar-se-á em melhorar os padrões dos serviços médicos e em assumir sua responsabilidade em relação à saúde pública, à educação sanitária e à legislação referente à saúde.

Qual(is) afirmativa(s) está(ão) **INCORRETA(S)** em relação aos princípios do Capítulo I do CEM:

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a IV.
- E) Todas estão incorretas.

52. O uso crônico de medicamentos da classe inibidores de bomba de prótons é frequente em quase todo o mundo. Há muitos pacientes que fazem o uso do medicamento sem a indicação adequada. No entanto, avolumam-se estudos apontando para os riscos de tal conduta. Marque a afirmativa correta em relação a esse assunto:

- A) O uso crônico não está associado com deficiência de ferro e vitamina B12.
- B) Há aumento de risco para infecção por *Clostridium difficile*.
- C) Não há evidências conclusivas para o aumento de risco para infecção por *Clostridium difficile*.
- D) Os inibidores de bomba de prótons não apresentam metabolismo hepático, dessa forma, apresentam efeito nulo nas interações medicamentosas.
- E) Apenas o omeprazol está relacionado à deficiência de nutrientes quando do uso crônico.

53. São reações adversas medicamentosas do omeprazol:

- I - Cefaleia.
- II - Náusea.
- III - Dor abdominal.
- IV - Diarreia.

Das afirmativas acima, quais estão corretas:

- A) Apenas a I e II.
- B) Apenas a I e III.
- C) Apenas a II, III e IV.
- D) Apenas a III e IV.
- E) Todas estão corretas.

54. Sobre o uso de domperidona, considere as afirmativas abaixo:

- I - Não há necessidade de avaliação do intervalo QT em pacientes cardiopatas ou com distúrbios em eletrólitos.
- II - A principal via metabólica é o CYP3A4, podendo causar interações fármaco-fármaco.
- III - Há necessidade de avaliação do intervalo QT em pacientes que fazem uso de antipsicóticos ou inibidores seletivos da recaptção de serotonina.

Das afirmativas acima, qual(ais) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a II e III.
- E) Todas estão corretas.

55. A doença hepática gordurosa não alcoólica é a causa mais comum de doença hepática crônica, afetando cerca de 25% da população global. Considere as afirmativas abaixo sobre essa condição:

- I - Os fatores de risco mais frequentes são obesidade, diabetes tipo 2 e dislipidemia.
- II - Para a caracterização da doença deve ser considerado como fator de exclusão o consumo significativo de álcool mais do que 140g/ semana para os homens (\pm 21 doses) e 70g/semana para mulheres (\pm 14 doses).
- III - Deve-se realizar biópsia hepática em todos pacientes diagnosticados.

Das afirmativas acima, qual(ais) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e II.
- E) Todas estão corretas.

56. O desenvolvimento de linhas de cuidado para pessoas com risco ou com o diagnóstico de determinadas doenças possibilita a contemplação de quais princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde:

- A) Equidade e universalidade.
- B) Gratuidade e planejamento.
- C) Integralidade e equidade.
- D) Planejamento e humanização.
- E) Universalidade e integridade.

57. Sobre a Política Nacional de Humanização do SUS (PNH), considere as afirmativas abaixo:

- I - O acolhimento refere-se ao Processo constitutivo das práticas de produção e promoção de saúde que implica responsabilização do trabalhador/equipe pelo usuário, desde a sua chegada até a sua saída.
- II - O acolhimento refere-se à organização de espaços saudáveis e acolhedores de trabalho.
- III - Por clínica ampliada, entende-se a prática interdisciplinar com a proposta de entender o significado do adoecimento e tratar a doença no contexto de vida propõe qualificar o modo de se fazer saúde.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(as)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e III.
- E) Todas estão corretas.

58. Segundo Barbara Starfield, os princípios da atenção primária à saúde (APS) são classificados em atributos essenciais e atributos derivados. Considere as afirmativas abaixo:

- I - O acesso de primeiro contato, a integralidade, a longitudinalidade e a coordenação da atenção são atributos essenciais.
- II - A orientação familiar pressupõe que a atenção à saúde seja regular e continuada com seguimento ao longo do tempo.
- III - A coordenação da atenção articula o fluxo entre os diferentes pontos da rede de atenção à saúde.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(as)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e II.
- E) Apenas a I e III.

59. O(a) _____ é uma forma de produzir saúde em que duas ou mais equipes, num processo de construção compartilhada, criam propostas de intervenção pedagógico-terapêutica.

Para que o trecho esteja correto, a lacuna deve ser preenchida por:

- A) coordenação
- B) matriciamento
- C) referenciamento
- D) co-gestão
- E) descentralização

60. Sobre medicina baseada em evidências (M.B.E.), considere:

- I - Nível de evidência A corresponde principalmente a ensaios clínicos randomizados, com controles adequados.
- II - O sistema GRADE define a forma clara e objetiva o grau de recomendação para se adotar uma determinada conduta, podendo ser forte (1) ou fraco (2).
- III - Uma evidência com nível C indica forte confiança de que o verdadeiro efeito esteja próximo daquele estimado.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e II.
- E) Todas estão corretas.

RASCUNHO