



PROVA OBJETIVA – Nível Superior
CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA – NEONATOLOGIA
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS
CONCURSO PÚBLICO – Edital de Abertura nº 059/2022

ANTES DA PROVA:



Olá! Leia as orientações para a realização da prova conforme o Edital de Abertura. Boa sorte!



- * Confira seus dados na Grade de Respostas: Nome, Nº de Inscrição e Cargo. Caso haja equívoco, comunique imediatamente ao fiscal da sala.
- * Verifique se este caderno corresponde ao cargo ao qual você realizou sua inscrição e contém o número de questões conforme expresso em edital. Caso contrário, solicite a substituição do caderno.
- * Selecione APENAS UMA alternativa correta para cada questão, que contam com 5 alternativas de resposta (A, B, C, D, E).
- * Seus aparelhos eletrônicos (relógios, celulares...) devem estar acondicionados dentro do envelope de segurança fornecido, que deve ser lacrado antes de entrar na sala.

DURANTE A PROVA:



- * Preencha e assine a Grade de Respostas e a Ata de Presença, conforme o documento apresentado, utilizando caneta preta ou azul. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira, borracha, marca-texto e outros itens durante a realização da prova.
- * Preencha a Grade de Respostas marcando apenas uma alternativa para cada questão. Questões rasuradas, com mais de uma marcação ou em branco serão anuladas.
- * Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de materiais de consulta de qualquer natureza.
- * Nenhuma questão será anulada durante o período de prova. Escolha sempre uma das alternativas. Você poderá solicitar Recurso Administrativo sobre o gabarito preliminar, conforme datas do cronograma de execução.
- * Fique atento ao tempo de realização da prova, incluindo o preenchimento da Grade de Respostas conforme orientação apresentada na sala.

APÓS A PROVA:



- * Você poderá levar consigo o Caderno de Questões após 02 (duas) horas do início da prova.
- * Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal da sala, aguardando a autorização para entregar a Grade de Respostas.
- * Os dois últimos candidatos devem permanecer em sala a fim de assinar o termo de encerramento das atividades da sala.
- * O gabarito preliminar será divulgado conforme o cronograma de execução deste edital.



Direitos autorais reservados à Fundação La Salle.
Proibida Reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

Acesse o site:
www.fundacaolasalle.org.br/concursos
ou utilize o QR code ao lado.



LÍNGUA PORTUGUESA

As questões de número 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

A geração Covid: o impacto da pandemia no desenvolvimento das crianças

01 A conta chegou! Como era de esperar, a pandemia deixou cicatrizes no
02 desenvolvimento dos nossos filhos. É o que documentam os primeiros estudos sobre a
03 chamada Geração Covid, aquela que nasceu ou cresceu durante o período de restrições
04 desencadeadas pelo coronavírus.

05 Com o isolamento social e uma rotina distante de outras crianças e da escola, boa parte
06 dos pequenos teve experiências limitadas numa etapa da vida marcada por descobertas e a
07 exploração do mundo. O universo ficou confinado ___ paredes de casa, a interação com os
08 outros encolheu e o acesso __ educação e às opções de lazer também saiu prejudicado.

09 Já dava para antever os efeitos desse cenário conturbado no desenvolvimento físico,
10 _____ e emocional dos mais novos. E, de fato, a ciência desnuda agora as consequências.

11 Uma pesquisa da Universidade Colúmbia, nos Estados Unidos, comparou a evolução
12 esperada de bebês de 6 meses nascidos antes e durante a pandemia. Resultado: os
13 especialistas notaram que os pequenos que _____ ao mundo em meio ao isolamento
14 tiveram pontuações mais baixas no desenvolvimento motor — importante para virar sozinho de
15 barriga pra baixo e pegar um brinquedo com as mãos, por exemplo — e socioemocional, aquele
16 que molda o convívio com pessoas fora do círculo familiar.

17 Para a psicóloga Maria Beatriz Martins Linhares, professora sênior da Faculdade de
18 Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP), esses achados eram
19 previstos. “A primeira infância é a fase em que a arquitetura cerebral está pulsante, é o momento
20 ideal para aprender e ganhar habilidades básicas para a trajetória do desenvolvimento humano”,
21 justifica. É nessa janela temporal que o contato com a natureza e os outros, as brincadeiras ao
22 ar livre e a vivência de desafios estimulam o cérebro e _____ o corpo crescer com saúde.

23 Tudo isso foi podado entre os filhos da pandemia. “A restrição das atividades nos
24 primeiros anos de vida claramente impacta no curto, no médio e no longo prazo. A área do
25 cérebro ligada __ integração social fica comprometida, bem como as habilidades cognitivas e
26 as relacionadas ao planejamento motor”, resume a neuropediatra Liubiana Arantes, presidente
27 do Departamento de Pediatria do Desenvolvimento da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

28 As descobertas do estudo de Colúmbia, e de tantos outros tocados pelo globo, tornam
29 mais palpável a angústia dos pais dessa geração. _____ daqueles que começaram a
30 desconfiar de atrasos no aprendizado de tarefas como engatinhar, andar e falar.

31 A saúde mental também não passou em branco — mesmo entre os novinhos de tudo.
32 No Brasil, um estudo conduzido pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e a
33 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apontou um crescimento significativo no número
34 de bebês que, aos 6 meses, apresentavam irritabilidade e dificuldades de adaptação à rotina.

35 “Sabemos que a pandemia aumentou a sobrecarga dos pais, e esses comportamentos
36 infantis podem ser entendidos como um reflexo do estresse parental, do uso frequente de telas
37 ou mesmo da falha em compreender e atender as demandas das crianças”, analisa __ pediatra
38 Claudia Lindgren Alves, professora da UFMG e coordenadora do trabalho.

39 Segundo Maria Beatriz, o estresse crônico, em todos os sentidos, deve ser encarado
40 como um fator de risco para o desenvolvimento infantil. “A chance de haver impactos negativos
41 em um cenário estressor é sempre potencializada”, afirma a psicóloga e docente da USP.

Disponível em < <https://saude.abril.com.br/familia/a-geracao-covid-o-impacto-da-pandemia-no-desenvolvimento-das-criancas/> > (adaptado).

01. Considerando o emprego do sinal indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 07, 08, 25 e 37.

- A) as – à – à – a.
- B) às – a – à – a.
- C) às – à – à – a.
- D) às – à – à – à.
- E) as – à – a – a.

02. Considerado a ortografia vigente, as lacunas das linhas 10, 13, 22 e 29 devem ser, respectivamente, preenchidas por

- A) psíquico – chegaram – fazem – Sobre tudo.
- B) psíquico – chegaram – fazem – Sobretudo.
- C) písíquico – chegarão – faz – Sobretudo.
- D) pissíquico – chegarão – faz – Sobretudo.
- E) písíquico – chegaram – faz – Sobre tudo.

03. Sobre as palavras “psicóloga” e “achados”, avalie as afirmações abaixo e assinale (V) para Verdadeiro e (F) para Falso.

- () Ambas são paroxítonas.
- () Ambas possuem hiato.
- () Somente a segunda possui dígrafo.
- () A primeira possui tritongo.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V – V.
- B) V – F – V – F.
- C) F – F – F – F.
- D) V – V – F – V.
- E) F – F – V – F.

04. Na linha 01, o verbo “deixou”, no contexto em que se encontra, é

- A) intransitivo.
- B) transitivo direto.
- C) transitivo indireto.
- D) transitivo direto e indireto.
- E) de ligação.

05. Analise as afirmativas abaixo.

- I - Na linha 07, o termo “O universo”, no contexto em que se encontra, é o sujeito da oração.
- II - Na linha 12, o termo “a”, no contexto em que se encontra, é adjunto adnominal.
- III - Na linha 31, o termo “saúde”, no contexto em que se encontra, é o núcleo do sujeito composto.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

06. Com base no texto, analise as afirmativas abaixo.

- I - O texto ratifica que a pandemia trouxe malefícios para as crianças.
- II - Maria Beatriz Linhares não concorda com os resultados obtidos pela pesquisa da Universidade Colúmbia.
- III - Somente a Universidade Colúmbia realizou estudos sobre o assunto abordado no texto.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

07. Analise o trecho a seguir:

“Com o isolamento social e uma rotina distante de outras crianças e da escola, boa parte dos pequenos teve experiências limitadas numa etapa da vida marcada por descobertas e a exploração do mundo.”

Ao trocarmos a expressão “boa parte dos pequenos” por “os pequenos”, quantas palavras sofreriam, obrigatoriamente, alteração para fins de concordância?

- A) Uma
- B) Duas
- C) Três
- D) Quatro
- E) Cinco

08. Em “As descobertas do estudo de Colúmbia, e de tantos outros tocados pelo globo, tornam mais palpável a angústia dos pais dessa geração.” é correto afirmar que há,

- A) conjunção alternativa e interjeição.
- B) advérbio e artigo indefinido.
- C) pronome possessivo e conjunção alternativa.
- D) artigo indefinido e preposição essencial.
- E) artigo definido e preposição essencial.

09. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

(1) Verbo pertencente à primeira conjugação.	() Chegou
(2) Verbo pertencente à segunda conjugação.	() Impacta
(3) Verbo pertencente à terceira conjugação.	() Sabemos
	() Saiu

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- A) 1 – 1 – 2 – 3.
- B) 1 – 1 – 3 – 2.
- C) 3 – 3 – 1 – 3.
- D) 2 – 3 – 1 – 2.
- E) 1 – 3 – 2 – 1.

10. Observe as seguintes perguntas:

- I – Quantos bebês participaram da pesquisa realizada pela Universidade Colúmbia?
- II – Qual o cargo de Liubiana Arantes na Sociedade Brasileira de Pediatria?
- III – Quem faz parte da Geração Covid?

Das perguntas acima, qual(is) é(são) respondida(s) pelo texto?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

LEGISLAÇÃO

11. No que tange à Lei de Improbidade Administrativa, da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública caberá:

- A) Mandado de segurança.
- B) Apelação.
- C) Agravo de instrumento.
- D) Recurso ordinário.
- E) Recurso extraordinário.

12. No que tange ao Estatuto do Idoso, relativamente ao seu direito à saúde, marque a alternativa INCORRETA:

- A) Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 (oitenta) anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência.
- B) À pessoa idosa que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável.
- C) À pessoa idosa internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico.
- D) É vedada a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.
- E) O idoso que não esteja no pleno gozo de suas faculdades mentais, incapaz de optar pela realização de tratamento de saúde, deverá ser encaminhado por seu médico quando ocorrer iminente risco de morte, independente de notificação a familiares ou ao Ministério Público, em razão do estado de necessidade do paciente.

13. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, são requisitos para a concessão de pedidos de colocação em família substituta, EXCETO:

- A) Qualificação completa do requerente e de seu eventual cônjuge, ou companheiro, com expressa anuência deste.
- B) Certidão do trânsito em julgado da sentença penal condenatória que destituiu o poder familiar dos pais biológicos.
- C) Declaração sobre a existência de bens, direitos ou rendimentos relativos à criança ou ao adolescente.
- D) Indicação de eventual parentesco do requerente e de seu cônjuge, ou companheiro, com a criança ou adolescente, especificando se tem ou não parente vivo.
- E) Indicação do cartório onde foi inscrito nascimento, anexando, se possível, uma cópia da respectiva certidão.

14. No que concerne à Lei Maria da Penha, marque a alternativa CORRETA:

- A) Os crimes praticados contra a mulher serão julgados pelos Juizados Especiais Criminais, previstos na Lei nº 9099/95.
- B) Os delitos punidos na Lei Maria da Penha são de ação penal pública incondicionada, isto é, independem da vontade da vítima quando do oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.
- C) Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, sem exceções.
- D) Como medida protetiva de distanciamento do agressor em relação à vítima, os juízes, por força de previsão na Lei, fixam o mínimo de 200 (duzentos) metros entre os envolvidos.
- E) Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

15. Os servidores da Secretaria Municipal de Saúde e Serviço Social em atividades em creches e unidades sanitárias terão uma gratificação correspondente a:

- A) 20% (vinte por cento) do valor líquido do respectivo cargo, sobre o qual incidem gratificações.
- B) 20% (vinte por cento) do valor básico inicial do respectivo cargo, sem a incidência de vantagens.
- C) 25% (vinte e cinco por cento) do valor básico inicial do respectivo cargo, sobre o qual não incidirão quaisquer gratificações ou vantagens.
- D) 25% (vinte e cinco por cento) do valor bruto do respectivo cargo, sobre o qual incidem gratificações.
- E) 30% (trinta por cento) do valor básico inicial do respectivo cargo, sobre o qual não incidirão quaisquer gratificações ou vantagens.

16. Dos direitos à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana e ao esporte e lazer NÃO compreendem:

- A) A produção, a comercialização, a aquisição e o uso de artigos e materiais religiosos adequados aos costumes e às práticas fundadas na respectiva religiosidade, ressalvadas as condutas vedadas por legislação específica.
- B) A comunicação ao Ministério Público para abertura de ação penal em face de atitudes e práticas de intolerância religiosa nos meios de comunicação e em quaisquer outros locais.
- C) A assistência religiosa aos praticantes de religiões de matrizes africanas internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, excluindo-se àqueles submetidos a pena privativa de liberdade.
- D) A capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional, nos termos da Lei Maior.
- E) É facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas pelos capoeiristas e mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos.

17. Segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Porto Alegre, relativamente ao aproveitamento é INCORRETO afirmar que:

- A) No aproveitamento, terá preferência o que estiver a mais tempo em disponibilidade e, no caso de empate, o que contar mais tempo de serviço público municipal
- B) O funcionário que, no prazo de trinta dias, não entrar em exercício será considerado em abandono do cargo.
- C) O aproveitamento dependerá de prova de capacidade física e mental, mediante perícia médica.
- D) Em casos de aproveitamento, provada em perícia médica a incapacidade definitiva para o serviço público em geral, o funcionário será aposentado.
- E) O funcionário não poderá ser aproveitado a pedido em cargo de natureza diversa daquele de que era titular.

18. No que concerne ao direito à cultura, à educação, ao esporte e ao lazer, pelo Estatuto Estadual da Igualdade Racial, o Estado deverá promover políticas que valorizem a cultura por exemplo:

- A) Do *hip hop*, do *rap* e do *funk*.
- B) Do *hip hop*, do *brake dance* e do *blues*.
- C) Do *rap* e da pintura de grafite.
- D) Do *brake dance* e do *funk*.
- E) Do *hip hop* e do sertanejo universitário.

19. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, segundo a Constituição Federal, é de competência:

- A) Exclusiva dos municípios.
- B) Privativa dos Estados.
- C) Privativa da União e do Distrito Federal.
- D) Comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- E) Comum dos Estados e municípios, apenas.

20. De acordo com expressa previsão da Lei complementar 478/2002, NÃO são consideradas acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho:

- I - a doença degenerativa.
- II - a inerente a grupo etário.
- III - a que não produza incapacidade laborativa.
- IV - a síndrome do pânico e a síndrome de *burnout*.

Das assertivas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas I, II e III.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e IV.
- E) Apenas IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Qual das alternativas abaixo é a cardiopatia congênita mais comum?

- A) Comunicação interatrial (CIA).
- B) Defeito do septo atrioventricular (DSAV).
- C) Coartação de aorta.
- D) Tetralogia de Fallot.
- E) Comunicação interventricular (CIV).

22. Assinale a alternativa abaixo que engloba apenas cardiopatias congênitas canal dependentes, ou seja, nas quais está indicado o uso de prostaglandina assim que realizado o diagnóstico:

- A) transposição de grandes artérias, tronco arterial comum e dupla via de saída do ventrículo direito.
- B) síndrome do coração esquerdo hipoplásico, coartação de aorta e tronco arterial comum.
- C) atresia pulmonar com septo interventricular íntegro, anomalia de ebstein e transposição de grandes artérias.
- D) coartação de aorta, síndrome do coração esquerdo hipoplásico e tetralogia de fallot.
- E) transposição de grandes artérias, coarctação de aorta e síndrome do coração esquerdo hipoplásico.

23. Um recém-nascido prematuro extremo grave que apresenta hipotensão arterial refratária deve ser decorrente principalmente de:

- A) Insuficiência renal aguda.
- B) Insuficiência adrenal relativa.
- C) Má contratilidade miocárdica difusa.
- D) Vasodilatação periférica generalizada.
- E) Disautonomia.

24. Paciente de 26 anos, primigesta, 35 semanas de idade gestacional, chega no centro obstétrico em trabalho de parto ativo. Realizou 8 consultas de pré-natal em serviço de pré-natal de alto risco devido a pré-eclampsia e HIV positivo. Faz uso regular de metildopa e terapia antirretroviral, última carga viral HIV com 3.000 cópias em exames do segundo trimestre. Em relação ao manejo inicial do atendimento ao recém-nascido exposto, neste caso, é correto afirmar:

- A) O aleitamento materno está contraindicado e o recém-nascido tem indicação de receber apenas zidovudina (AZT) como terapia antirretroviral até os 28 dias de vida.
- B) O aleitamento materno cruzado deve ser estimulado e o recém-nascido tem indicação de receber apenas zidovudina (AZT) como terapia antirretroviral até os 28 dias de vida.
- C) O aleitamento materno está contraindicado e o recém-nascido tem indicação de receber zidovudina e nevirapina como terapia antirretroviral.
- D) O aleitamento materno está contraindicado e o recém-nascido tem indicação de receber zidovudina, lamivudina e raltegravir como terapia antirretroviral.
- E) O aleitamento materno está contraindicado e o recém-nascido tem indicação de receber apenas zidovudina (AZT) como terapia antirretroviral até os 28 dias de vida se a gestante recebeu zidovudina (AZT) durante o trabalho de parto.

25. Sobre a permeabilidade do canal arterial, é INCORRETO afirmar:

- A) Em recém-nascidos a termo o fechamento funcional do canal arterial costuma ocorrer entre 24-48 horas de vida e o fechamento anatômico por volta dos 7-10 dias de vida.
- B) Em recém-nascidos prematuros a prevalência da persistência do canal arterial é inversamente proporcional à idade gestacional.
- C) O tratamento farmacológico para fechamento do canal arterial consiste no uso de indometacina, ibuprofeno ou paracetamol para recém-nascidos independente da idade gestacional.
- D) A apresentação cardiovascular típica é de um sopro contínuo em região infraclavicular esquerda, pulsos periféricos de amplitude aumentada (pulso em martelo d'água) e pressão de pulso elevada.
- E) A administração de surfactante, uso precoce de furosemida, alta administração de fluidos e ausência de exposição à glicocorticoide pré-natal são fatores associados à persistência do canal arterial.

26. Relacione as colunas que preenchem adequadamente a relação da droga vasoativa e o seu principal mecanismo de ação e/ou efeito sistêmico:

1. Dopamina	()	Ação predominantemente alfa-adrenérgica/vasoconstrição.	
2. Dobutamina	()	Ação predominantemente beta-adrenérgica/inotropismo e cronotropismo.	e
3. Noradrenalina	()	Vasoconstrição periférica e antidiurética.	
4. Vasopressina	()	Efeito dose dependente, em doses baixas causa inotropismo e vasodilatação periférica.	

A ordem correta do preenchimento dos parênteses, de cima para baixo é:

- A) 3 – 2 – 4 – 1
- B) 2 – 3 – 4 – 1
- C) 1 – 3 – 2 – 4
- D) 4 – 2 – 3 – 1
- E) 4 – 3 – 2 – 1

27. Paciente prematuro de 29 semanas, atualmente com 10 dias de vida, está internado na UTI neonatal do hospital que você trabalha. Paciente está em CPAP nasal, recebe dieta via sonda orogástrica (fórmula de prematuro), ibuprofeno (para tratamento de persistência de canal arterial) e cafeína. Você é chamado para avaliar este paciente por quadro de vômitos alimentares, hipoatividade e distensão abdominal. Qual sua principal suspeita diagnóstica, exame complementar e tratamento, respectivamente?

- A) Estenose hipertrófica de piloro, ecografia abdominal, piloromiotomia.
- B) Invaginação intestinal, ecografia abdominal, enema.
- C) Enterocolite necrosante, RX de abdome agudo, NPO + ATB e cirurgia conforme classificação.
- D) Alergia à proteína do leite de vaca, IgE, troca da fórmula láctea para extensamente hidrolisada.
- E) Volvo intestinal, ecografia abdominal, cirurgia.

28. Em relação ao atendimento do recém-nascido em sala de parto é correto afirmar, conforme a diretriz da SBP de reanimação neonatal:

- A) Quando o paciente necessita manobras de reanimação neonatal o oxímetro deve ser colocado em qualquer um dos membros superiores e o alvo de saturação até o 5º minuto é entre 70 a 80% e entre o 5º e 10º min de vida entre 80 a 90%.
- B) A FiO2 sugerida para iniciar na VPP no RN > 34 semanas é de 21% e nos < 34 semanas é 30%.
- C) Recomenda-se manter a normotermia do recém-nascido < 34 semanas (Tax 36,5 a 37,5°C) pois a hipertermia pode agravar lesão cerebral nos pacientes asfíxiados, no entanto, a temperatura corporal à admissão neonatal não é um fator preditor de morbimortalidade.
- D) A intubação orotraqueal em sala de parto só está indicada em pacientes em que a ventilação por máscara facial não foi efetiva ou é prolongada (paciente não assume ventilação espontânea) e/ou necessidade de massagem cardíaca.
- E) Após iniciada as manobras de reanimação neonatal - ventilação e/ou compressão cardíaca - o paciente deve ser avaliado quanto à resposta dessas a cada 30 segundos.

29. A ventilação mecânica é uma ferramenta usada diariamente na rotina do médico neonatologista. Em relação a esse tema, assinale verdadeiro ou falso:

- () A PIP, PEEP e Tinspiratório são fatores determinantes da pressão média das vias aéreas que reflete na oxigenação do paciente
- () Na tentativa de melhorar a ventilação alveolar a única ferramenta que pode ser ajustada no ventilador é a frequência respiratória
- () Na ventilação oscilatória de alta frequência o fluxo expiratório é passivo, assim como na ventilação mecânica convencional, e os parâmetros necessários à serem setados quando desejamos instalar esse modo ventilatório são: FiO2, frequência respiratória, pressão média das vias aéreas, amplitude ou delta de pressão e relação inspiratória:expiratória

A ordem correta do preenchimento dos parênteses, de cima para baixo é:

- A) F – V – V
- B) F – F – V
- C) V – F – F
- D) V – F – V
- E) V – V – V

30. Em relação à hemorragia intraventricular no período neonatal é correto afirmar:

- A) A hemorragia intraventricular é uma patologia que acomete somente os recém-nascidos pré – termo.
- B) A hemorragia intraventricular acontece principalmente nos recém – nascidos prematuros e dentro de 48 – 72horas após o nascimento.
- C) Não há necessidade de realizar investigação de hemorragia intraventricular em recém – nascido prematuro extremo assintomático do ponto de vista neurológico.
- D) A dilatação ventricular pós hemorrágica é a complicação mais comum da hemorragia intraventricular mas sua incidência não aumenta conforme a gravidade da hemorragia.
- E) Os pacientes prematuros apresentam adequado funcionamento do sistema de autorregulação do fluxo cerebral, por isso a instabilidade hemodinâmica/oscilações bruscas de pressão arterial não compoem fator de risco para hemorragia intraventricular.

31. A principal causa de crise convulsiva neonatal é:

- A) Hipoglicemia
- B) Hipocalcemia
- C) Meningite
- D) Encefalopatia hipóxico – isquêmica
- E) Hemorragia intraventricular

32. Quais as duas principais causas de estridor no período neonatal?

- A) Laringite e laringomalacia.
- B) Paralisia de pregas vocais e anel vascular.
- C) Paralisia de pregas vocais e laringomalacia.
- D) Laringomalacia e anel vascular.
- E) Laringomalacia e estenose subglótica congênita.

- 33. A ferramenta padrão – ouro para diagnóstico de displasia de desenvolvimento do quadril no período neonatal é:**
- A) RX de bacia
 - B) Ecografia do quadril
 - C) Exame físico – manobra de Ortolani
 - D) Tomografia computadorizada de quadril
 - E) Exame físico – manobra de Barlow
- 34. Em relação ao cateterismo umbilical em recém-nascidos está incorreto afirmar:**
- A) A posição adequada do cateter umbilical arterial em posição alta é entre a sexta e décima vértebras torácicas e na posição baixa entre a terceira e quarta vértebras lombares.
 - B) O tempo máximo de permanência do cateter umbilical arterial e venoso para reduzir complicações infecciosas e trombóticas é respectivamente 7 e 10 dias.
 - C) A cianose persistente, a má perfusão das extremidades distais e a presença de hematúria são indicações para remoção do cateter arterial umbilical.
 - D) A incidência de complicações associadas aos cateteres umbilicais é diretamente relacionada com o período que o cateter é deixado.
 - E) A infusão de soluções de heparina nos cateteres umbilicais diminui a incidência de complicações trombóticas.
- 35. Paciente de 37 semanas de idade gestacional com 48 horas de vida foi avaliado em leito de alojamento conjunto quanto à possibilidade de alta hospitalar. No exame físico paciente está icterício até a altura dos joelhos, peso atual de 2900g (peso de nascimento foi 3050g), tipagem sanguínea do recém-nascido A+ e tipagem sanguínea materna O+. Qual seria a melhor conduta diante do caso?**
- A) Paciente em condições de alta hospitalar com diagnóstico de icterícia fisiológica do recém-nascido.
 - B) Paciente em condições de alta hospitalar com prescrição de aleitamento materno misto devido à icterícia por baixo aporte.
 - C) Paciente necessita avaliação complementar da icterícia com exames laboratoriais pois conforme escala/zonas de Krammer e fatores de risco pode ter indicação de fototerapia.
 - D) Paciente com indicação de fototerapia por tratar – se de icterícia por incompatibilidade ABO.
 - E) Paciente necessita avaliação complementar da icterícia com exames laboratoriais que podem ser realizados ambulatorialmente já que paciente é de baixo risco para necessidade de fototerapia.
- 36. Em relação à exsanguineotransfusão é correto afirmar, EXCETO:**
- A) A quantidade de sangue a ser trocado consiste em duas volemias.
 - B) Está indicada quando a fototerapia não consegue impedir a elevação da bilirrubina a níveis tóxicos.
 - C) Está indicada em neonatos hidróticos com doença hemolítica.
 - D) São complicações do procedimento a hipomagnesemia, hipocalcemia, hipocalemia e hipoglicemia.
 - E) O sangue utilizado para o procedimento deve estar em temperatura ambiente.
- 37. Em relação aos testes de triagem neonatal é correto afirmar:**
- A) São testes com alta especificidade.
 - B) O teste do olhinho deve ser realizado quando o recém – nascido estiver no alojamento conjunto e, sendo normal, não tem indicação de ser repetido.
 - C) O teste de emissões otoacústicas pode ser normal em pacientes com surdez neurosensorial.
 - D) O teste do coraçãozinho deve ser feito idealmente nas primeiras 24 horas de vida.
 - E) A amostra de sangue do teste de triagem metabólica do recém – nascido só pode ser coletada do pezinho.
- 38. Em relação a sepse neonatal precoce está INCORRETO afirmar:**
- A) Por definição é quando a evidência diagnóstica surge em até 48 a 72 horas após o nascimento.
 - B) A Escherichia coli e o Streptococcus agalactiae são os principais patógenos.
 - C) A incidência de meningite na sepse precoce é baixa.
 - D) A utilização de hemograma e PCR é útil especialmente por seu valor preditivo negativo.
 - E) Em recém – nascido pré – termo tardio e a termo com fatores de risco para sepse neonatal precoce e assintomáticos a observação clínica seriada, sem triagem infecciosa e uso empírico de antibióticos não é recomendada.

39. Gestante de 38 semanas internou no centro obstétrico em fase ativa de trabalho de parto, realizou pré – natal, única particularidade dos exames de pré – natal era o achado de polidrâmnio em ecografia obstétrica. Nasceu RN de sexo masculino que necessitou de aspiração de vias aérea em sala de parto por secreção salivar abundante em orofaringe. Em seguida retornou para o pele a pele. Durante internação em alojamento conjunto recém – nascido apresentou engasgos e crise de cianose durante as mamadas e internou na UTI neonatal para investigação diagnóstica. Diante o caso acima exposto qual seria a principal hipótese diagnóstica?

- A) Tetralogia de Fallot
- B) Atresia de duodeno
- C) Atresia de esôfago
- D) Disfagia orofaríngea
- E) Crise convulsiva

40. Considerando a sua hipótese do caso acima, qual seria o principal exame para diagnóstico?

- A) RX de abdome agudo.
- B) Eletroencefalograma.
- C) Ecocardiograma.
- D) Videodeglutograma.
- E) Passagem de sonda orogástrica e posterior RX de tórax e abdome.

41. O paciente com atresia de esôfago pode ter outras anomalias associadas e que devem ser pesquisadas, sendo as mais comuns:

- A) Anomalias anorrerais.
- B) Anomalias cardiovasculares.
- C) Anomalias vertebrais.
- D) Anomalias renais.
- E) Laringotraqueomalacia.

42. Em relação a hipoglicemia neonatal, podemos afirmar, EXCETO:

- A) Os recém – nascidos prematuros, pequenos para idade gestacional, grandes para idade gestacional e filhos de mães diabéticas constituem os de maior risco para hipoglicemia.
- B) Quando se utiliza o hemoglicoteste (HGT) para aferição da glicemia este representa valores 10 – 15% menores do que aqueles dosados diretamente do plasma.
- C) O valor de definição de hipoglicemia variam conforme as sociedades (AAP x Sociedade de endocrinologia) e conforme o tempo de vida.
- D) A hipoglicemia neonatal pode levar a alterações do neurodesenvolvimento a longo prazo.
- E) O prognóstico dos pacientes com hipoglicemia depende da presença de sintomas e não do valor da glicemia.

43. Relacione a infecção congênita neonatal com uma de sua mais provável/compatível apresentação clínica:

1. Sífilis	()	Tríade de Sabin
2. Toxoplasmose	()	Microcefalia
3. Citomegalovirose	()	Encefalite
4. Herpes vírus	()	Pênfigo palmo – plantar
5. Rubéola	()	Catarata

A ordem correta do preenchimento dos parênteses, de cima para baixo é:

- A) 3 – 2 – 4 – 1 – 5
- B) 2 – 3 – 4 – 1 – 5
- C) 5 – 3 – 2 – 1 – 4
- D) 1 – 2 – 3 – 5 – 4
- E) 2 – 3 – 5 – 1 – 4

- 44. Em um recém – nascido com suspeita em de hidronefrose em ecografia obstétrica qual o melhor momento para realizar ultrassonografia de vias urinárias pós – natal?**
- A) com 72 horas a 7 dias de vida.
 - B) ao fim do primeiro mês de vida.
 - C) com 24 horas de vida.
 - D) com 6 meses de vida.
 - E) com 1 ano de vida.
- 45. Em relação a osteopenia da prematuridade é INCORRETO afirmar:**
- A) A perda de até 40% da mineralização óssea pode ocorrer sem alterações radiográficas.
 - B) A formação óssea depende da disponibilidade adequada de cálcio e fósforo, por isso, os prematuros geralmente se beneficiam do enriquecimento do leite humano (por exemplo FM85) ou uso de fórmula para prematuros.
 - C) Doses altas de vitamina D (> 400 UI/dia) são comprovadamente benéficas a curto e longo prazo.
 - D) A fisioterapia motora com movimentos passivos/amplitude dos movimentos pode aumentar o crescimento e a mineralização óssea.
 - E) As primeiras indicações laboratoriais de osteopenia são a diminuição do fósforo sérico e o aumento da fosfatase alcalina.
- 46. Qual das condições abaixo não é um fator contribuinte para displasia broncopulmonar?**
- A) Sobrecarga de fluidos.
 - B) Corioamnionite.
 - C) Imaturidade pulmonar.
 - D) Ventilação mecânica invasiva.
 - E) Hipoxemia.
- 47. Em relação a hipotermia terapêutica é correto afirmar:**
- A) Os resultados de neuroproteção são melhores nos pacientes com encefalopatia moderada em comparação com a grave.
 - B) Pacientes em hipotermia tem maior risco de desenvolver hipertensão pulmonar e necrose de gordura subcutânea.
 - C) A hipotermia está indicada em pacientes prematuros tardios e a termo com sinais de asfixia perinatal e encefalopatia hipóxico – isquêmica de qualquer grau.
 - D) A técnica de resfriamento do corpo inteiro é superior em relação ao resfriamento apenas da cabeça em relação aos resultados de morte e incapacidade neurológica grave.
 - E) A duração da hipotermia terapêutica deve ser de 72 a 96 horas.
- 48. Um recém – nascido com 28 semanas de idade gestacional encontra – se com desenvolvimento pulmonar em qual estágio de maturação?**
- A) Canalicular
 - B) Sacular
 - C) Pseudoglandular
 - D) Alveolar
 - E) Embrionário
- 49. O uso de diuréticos é comum dentro da UTI neonatal e pediátrica, sendo a furosemida o mais usado, os efeitos colaterais dessa terapêutica incluem:**
- A) hiponatremia, hipocalemia, hipocalcemia, alcalose metabólica hiperclorêmica
 - B) hiponatremia, hipopotassemia, hipocalcemia, alcalose metabólica hiperclorêmica
 - C) hiponatremia, hipocalemia, hipocalcemia, alcalose metabólica hipoclorêmica
 - D) hiponatremia, hipercalemia, hipocalcemia, alcalose metabólica hiperclorêmica
 - E) hiponatremia, hipocalemia, hipercalcemia, alcalose metabólica hipoclorêmica

- 50. Para qual dos pacientes abaixo está indicada a prescrição de Palivizumabe conforme Nota técnica do Ministério de Saúde:**
- A) Prematuro de 32 semanas atualmente com 1 ano e 8 meses.
 - B) Prematuro de 29 semanas atualmente com 11 meses.
 - C) Prematuro de 27 semanas atualmente com 1 ano e 6 meses.
 - D) Prematuro de 28 semanas atualmente com 11 meses.
 - E) Prematuro de 30 semanas atualmente com 6 meses.
- 51. Recém – nascido do sexo feminino que apresenta ao exame físico pescoço alado, edema de dorso de mãos e pés, e sopro cardíaco em foco aórtico, é portadora da síndrome de:**
- A) Edwards
 - B) Turner
 - C) Noonan
 - D) Down
 - E) Prader – Willi
- 52. A cânula de alto fluxo está cada vez mais sendo utilizada dentro das UTIs neonatais, o diâmetro que a cânula deve ocupar das narinas dos recém – nascidos em percentual é de:**
- A) 50
 - B) 10
 - C) 30
 - D) 100
 - E) 80
- 53. Recém – nascido a termo internou na UTI neonatal por taquipneia, gemência e cianose central. Na monitorização observa – se diferença pré e pós – ductal de saturação de oxigênio de 20 pontos (80 e 60 respectivamente). Radiografia de tórax demonstra coração de tamanho normal e pulmões com discreta hipertransparência. O provável diagnóstico é:**
- A) Pneumotórax
 - B) Hipertensão pulmonar persistente do recém – nascido
 - C) Taquipneia transitória do recém – nascido
 - D) Hérnia diafragmática congênita
 - E) Enfisema lobar congênito
- 54. O sinal clássico da "dupla bolha" que pode ser identificado na radiografia de abdome do recém – nascido com algumas horas de vida, é sugestivo de:**
- A) Estenose hipertrófica de piloro.
 - B) Divertículo de meckel.
 - C) Doença de hirschprung.
 - D) Atresia de esôfago sem fístula.
 - E) Atresia de duodeno.
- 55. A circulação fetal apresenta características distintas da circulação do recém – nascido quanto a Resistência Vascular Pulmonar (RVP) e a Resistência Vascular Sistêmica (RVS). A alternativa que contempla essas características é:**
- A) RVP alta, RVS alta e preservação do fluxo sanguíneo cerebral e coronariano.
 - B) RVP baixa, RVS alta e preservação do fluxo sanguíneo cerebral e placentário.
 - C) RVP alta, RVS baixa e preservação do fluxo sanguíneo cerebral e coronariano.
 - D) RVP alta, RVS alta e preservação do fluxo sanguíneo coronariano.
 - E) RVP baixa, RVS baixa e preservação do fluxo sanguíneo pulmonar e da suprarrenal.
- 56. O desenvolvimento de linhas de cuidado para pessoas com risco ou com o diagnóstico de determinadas doenças possibilita a contemplação de quais princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde:**
- A) Equidade e universalidade.
 - B) Gratuidade e planejamento.
 - C) Integralidade e equidade.
 - D) Planejamento e humanização.
 - E) Universalidade e integridade.

57. Sobre a Política Nacional de Humanização do SUS (PNH), considere as afirmativas abaixo:

- I - O acolhimento refere-se ao Processo constitutivo das práticas de produção e promoção de saúde que implica responsabilização do trabalhador/equipe pelo usuário, desde a sua chegada até a sua saída.
- II - O acolhimento refere-se à organização de espaços saudáveis e acolhedores de trabalho.
- III - Por clínica ampliada, entende-se a prática interdisciplinar com a proposta de entender o significado do adoecimento e tratar a doença no contexto de vida propõe qualificar o modo de se fazer saúde.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e III.
- E) Todas estão corretas.

58. Segundo Barbara Starfield, os princípios da atenção primária à saúde (APS) são classificados em atributos essenciais e atributos derivados. Considere as afirmativas abaixo:

- I - O acesso de primeiro contato, a integralidade, a longitudinalidade e a coordenação da atenção são atributos essenciais.
- II - A orientação familiar pressupõe que a atenção à saúde seja regular e continuada com seguimento ao longo do tempo.
- III - A coordenação da atenção articula o fluxo entre os diferentes pontos da rede de atenção à saúde.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e II.
- E) Apenas a I e III.

59. O(a) _____ é uma forma de produzir saúde em que duas ou mais equipes, num processo de construção compartilhada, criam propostas de intervenção pedagógico-terapêutica.

Para que o trecho esteja correto, a lacuna deve ser preenchida por:

- A) coordenação
- B) matriciamento
- C) referenciamento
- D) co-gestão
- E) descentralização

60. Sobre medicina baseada em evidências (M.B.E.), considere:

- I - Nível de evidência A corresponde principalmente a ensaios clínicos randomizados, com controles adequados.
- II - O sistema GRADE define a forma clara e objetiva o grau de recomendação para se adotar uma determinada conduta, podendo ser forte (1) ou fraco (2).
- III - Uma evidência com nível C indica forte confiança de que o verdadeiro efeito esteja próximo daquele estimado.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e II.
- E) Todas estão corretas.

RASCUNHO