



Prefeitura Municipal de Porto Alegre
Coordenação de Seleção e Ingresso
Processo Seletivo 001/2011

PROVA ORAL 01
MÉDICO - PEDIATRIA
ATRIBUIÇÃO DE PONTOS E GABARITO

CANDIDATO: _____

SALA: _____ **Nº INSCRIÇÃO:** _____

1) Lactente de 5 meses chega na sala de emergência sem movimentos respiratórios e sem pulso. Mãe refere que criança estava com tosse há 2 dias e que vomitou a caminho do hospital. Qual a conduta inicial a ser empregada?

Respostas:	Pontos:
• ventilação com pressão positiva com oxigênio a 100%. • entubação traqueal.	• compressão cardíaca externa. • adrenalina IT, EV.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 correta.	7,0
Citou 2 corretas.	14,0
Citou 3 corretas.	21,0
Citou 4 corretas.	25,0

2) Menino de 6 anos com início súbito de falta de ar. Ao exame físico tem retração subcostal e intercostal. Sibilos inspiratórios e expiratórios simétricos, saturação de oxigênio 90% em ar ambiente. Quais medidas iniciais a serem adotadas?

Respostas:	Pontos:
• suplementação de oxigênio para manter a saturação > 95%.	• nebulização com beta 2 resgate. • corticoterapia.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 correta.	8,0
Citou 2 corretas.	16,0
Citou 3 corretas.	25,0

3) Após medidas iniciais, a criança mantém mesmo padrão respiratório e necessidade de oxigênio para manter saturação. Qual a conduta a seguir?

Respostas:	Pontos:
• internação para observação. • considerar salbutamol EV.	• considerar sulfato de magnésio.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 correta.	8,0
Citou 2 corretas.	16,0
Citou 3 corretas.	25,0

4) Menina com história de febre, vômitos e diarreia chega à emergência febril, mucosas secas, turgor diminuído, enchimento capilar maior do que 5 segundos e sonolenta. Qual a conduta a ser empregada?

:Resposta:	Pontos:
• expansão volumétrica • hidratação EV.	• antitérmico • exames laboratoriais.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 correta.	7,0
Citou 2 corretas.	14,0
Citou 3 corretas.	21,0
Citou 4 corretas.	25,0

TOTAL DA PROVA	
TOTAL DA EXPERIÊNCIA	
TOTAL GERAL	

Fiscal

Entrevistador

Entrevistador



Prefeitura Municipal de Porto Alegre
Coordenação de Seleção e Ingresso
Processo Seletivo 001/2011

PROVA ORAL 02
MÉDICO - PEDIATRIA
ATRIBUIÇÃO DE PONTOS E GABARITO

CANDIDATO: _____

SALA: _____ **Nº INSCRIÇÃO:** _____

1) Garoto de 4 anos com história de vômitos e perda de peso há 1 semana. Encontra-se comatoso, desidratação de grau III e hálito cetônico. Gasometria arterial $\text{pH}=6,9$ $\text{pCO}_2=20$ bicarbonato= 4, glicemia=525 mg/dL e cetonemia +. Qual é a conduta a ser adotada?

Respostas:	Pontos:
• Expansão volumétrica. • Iniciar insulina contínua EV.	• Controle de HGT h/h. • Solicitar eletrólitos.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 correta.	7,0
Citou 2 corretas.	14,0
Citou 3 corretas.	21,0
Citou 4 corretas.	25,0

2) Lactente de 6 meses chega na emergência em crise convulsiva tônico-clônica generalizada que dura aproximadamente 10 minutos. Exame físico normal exceto por febre. Qual é a conduta a ser empregada?

Respostas:	Pontos:
• ABC. • diazepam ou midazolam ou lorazepam EV, VR, IN.	• observação.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 correta.	8,0
Citou 2 corretas.	16,0
Citou 3 corretas.	25,0

3) Menino de 15 meses chega com estridor inspiratório e disfunção respiratória leve, bom estado geral e saturando 93% em ar ambiente. História de febre baixa e coriza hialina. Qual é a conduta a ser empregada?

Respostas:	Pontos:
• Oxigênio.	• Nebulização com adrenalina. • Corticóide.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 correta.	8,0
Citou 2 corretas.	16,0
Citou 3 corretas.	25,0

4) Escolar de 7 anos com início súbito de cefaléia frontal, coriza purulenta, febre alta e ótimo estado geral. Ao exame tem gota pós-nasal. Nega episódio febril prévio. Qual é a conduta a ser empregada?

Resposta:	Pontos:
• amoxicilina/ azitromicina VO.	• analgesia/antitérmico.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 corretas.	10,0
Citou 2 corretas.	25,0

TOTAL DA PROVA	
TOTAL DA EXPERIÊNCIA	
TOTAL GERAL	

Fiscal

Entrevistador

Entrevistador



PROVA ORAL 03
MÉDICO - PEDIATRIA
ATRIBUIÇÃO DE PONTOS E GABARITO

CANDIDATO: _____

SALA: _____ **Nº INSCRIÇÃO:** _____

1) Recém-nascido, masculino, de 10 dias de vida chega febril e toxêmico. Mãe sem pré-natal. Exames iniciais hemograma com leucocitose. Qual é a conduta a ser empregada?

Respostas:	Pontos:
- Coletar hemocultura/urocultura por PSP ou SVA/Líquor. - Iniciar ampicilina 300 mg/Kg/dia e gentamicina.	
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 correta.	10,0
Citou 2 corretas.	25,0

2) Menina de 4 meses com taquicardia de 220. ECG não se visualiza onda P. Hemodinamicamente estável. Qual é a conduta a ser empregada?

Respostas:	Pontos:
- Manobras vagais. - Adenosina.	
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 correta.	10,0
Citou 2 corretas.	25,0

3) Garoto de 6 meses chega com febre de 39° C, exame físico normal. Exames: Raio X de tórax normal e Hemograma normal. EQU por saco coletor com 20 leucócitos/campo. Qual é a conduta a ser empregada em situação de urgência?

Respostas:	Pontos:
- Coletar EQU urocultura por PSP/SVD. - Iniciar antibióticos.	
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 correta.	10,0
Citou 2 corretas.	25,0

4) Criança realizou quimioterapia há 2 semanas e iniciou hoje com quadro febril. Apresenta-se comatosa, taquicárdica e pulsos finos. Qual é a conduta a ser empregada?

Resposta:	Pontos:
- ABC. - Expansão volumétrica. - antibióticos (neutropenia febril). - triagem de febre (culturais).	
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 correta.	7,0
Citou 2 corretas.	14,0
Citou 3 corretas.	21,0
Citou 4 corretas.	25,0

TOTAL DA PROVA	
TOTAL DA EXPERIÊNCIA	
TOTAL GERAL	

Fiscal

Entrevistador

Entrevistador



PROVA ORAL 04
MÉDICO - PEDIATRIA
ATRIBUIÇÃO DE PONTOS E GABARITO

CANDIDATO: _____

SALA: _____ **Nº INSCRIÇÃO:** _____

1) Lactente de 6 meses chega na emergência em crise convulsiva tonico-clonica generalizada que dura aproximadamente 10 minutos. Exame físico normal exceto por febre. Qual é a conduta a ser empregada?

Respostas:	Pontos:
• ABC. • Diazepan ou midazolam ou lorazepam EV, VR, IN.	• Observação.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 correta.	8,0
Citou 2 corretas.	16,0
Citou 3 corretas.	25,0

2) Menino de 6 anos com início súbito de falta de ar. Ao exame físico tem retração subcostal e intercostal. Sibilos inspiratórios e expiratórios simétricos, saturação de oxigênio 90% em ar ambiente. Quais medidas iniciais a serem adotadas?

Respostas:	Pontos:
• Suplementação de oxigênio para manter a saturação > 95%.	• Nebulização com beta 2 resgate. • Corticoterapia.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 correta.	8,0
Citou 2 corretas.	16,0
Citou 3 corretas.	25,0

3) Após medidas iniciais, a criança mantém mesmo padrão respiratório e necessidade de oxigênio para manter saturação. Qual é a conduta a ser empregada nesse caso?

Respostas:	Pontos:
• Internação para observação.	• Considerar salbutamol EV. • Considerar sulfato de magnésio.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 correta.	8,0
Citou 2 corretas.	16,0
Citou 3 corretas.	25,0

4) Recém-nascido, masculino, de 10 dias de vida chega febril e toxêmico. Mãe sem pré-natal. Exames iniciais: hemograma com leucocitose. Qual é a conduta a ser empregada nesse caso?

Resposta:	Pontos:
• Coletar hemocultura/urocultura por PSP ou SVA/Líquor.	• Iniciar ampicilina 300 mg/Kg/dia e gentamicina.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 correta.	10,0
Citou 2 corretas.	25,0

TOTAL DA PROVA	
TOTAL DA EXPERIÊNCIA	
TOTAL GERAL	

Fiscal

Entrevistador

Entrevistador