



MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO E INGRESSO

CONCURSO PÚBLICO Nº 561

MÉDICO ESPECIALISTA – MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE

PROVA DE CONHECIMENTOS

INSTRUÇÕES GERAIS

- 1** - A prova contém 50 (cinquenta) questões. Verifique se ela está completa e sem falhas de impressão. Caso contrário, solicite ao Fiscal que providencie a substituição de sua prova.
- 2** - Para chamar o Fiscal, levante o braço e aguarde. Não levante da sua classe sem autorização do Fiscal.
- 3** - É obrigatório a assinatura na folha de respostas e seu preenchimento, conforme modelo exposto no quadro.
- 4** - Durante a realização da prova somente será permitido o uso de caneta esferográfica confeccionada em material transparente de tinta escura, de cor azul ou preta, conforme item **11.21** do Edital de Abertura.
- 5** - Cada questão oferece SOMENTE UMA opção correta ao questionamento proposto.
- 6** - Serão anuladas as questões que contiverem emendas, rasuras, borraduras ou qualquer assinalação diferente. Não amasse e não dobre a folha de respostas.
- 7** - Não serão permitidas consultas de nenhuma espécie.
- 8** - O candidato **NÃO** poderá fazer perguntas sobre o conteúdo das questões. Questionamentos sobre as questões deverão ser feitos em conformidade com o previsto no Edital de Abertura. Outras reclamações deverão ser encaminhadas diretamente à Coordenação de Seleção e Ingresso/SMA.
- 9** - Não será permitido fumar durante a realização da prova, bem como utilizar ou manter ligado qualquer aparelho eletrônico.
- 10** - A prova terá duração de **3 (três) horas e 30 (trinta) minutos**. Não haverá tempo extra para preenchimento da folha de respostas, ou seja, no tempo de prova está incluído o tempo para preenchimento das respostas.
- 11** - O fiscal indicará quando faltar 30 (trinta) minutos para o término do tempo de prova.
- 12** - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova após 1 (uma) hora do início da mesma e não será permitido seu retorno à sala após sua retirada, de acordo com os **subitens 11.11, 11.31 e 11.32** do Edital de Abertura.
- 13** - O candidato poderá levar consigo o caderno de questões somente após transcorridas 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do início das provas.
- 14** - A prova será disponibilizada no site da Prefeitura, na segunda-feira, dia **18/04/2016**.
- 15** - A **divulgação do gabarito** desta prova ocorrerá na segunda-feira, **18/04/2016**, no Diário Oficial de Porto Alegre.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

Sentimentos Femininos

01 Se estou conversando com uma mulher e os olhos dela se enchem de lágrimas – isso acontece
02 frequentemente com amigas, colegas de trabalho e namoradas – tenho a sensação, tristíssima, de ser um
03 humano defeituoso. É como se faltasse alguma coisa em mim que me impedisse de expressar meus
04 sentimentos e emoções da mesma forma. Enquanto elas choram, abraçam, suspiram, tremem, riem, gritam
05 e coram, eu tenho apenas o silêncio constrangido ou a racionalidade. Diante da algaravia exuberante dos
06 sentimentos femininos, quase nada.

07 A sensação não é minha apenas. A perplexidade dos homens frente ao repertório de emoções das
08 mulheres é antiga e disseminada. Meu sentimento mais comum é de inveja – como elas conseguem ir tão
09 fundo e tão rápido dentro de si mesmas, enquanto eu me sinto preso numa espécie de insensibilidade? –
10 mas é possível também ter medo e raiva. É fácil ser frustrado ou afogado por essa aluvião de emoções. É
11 comum que, por causa de sentimentos ou da ausência deles, a conversa entre homens e mulheres
12 desambe para a mútua incompreensão.

13 Houve um tempo, que terminou recentemente, em que era possível passar a vida no universo
14 seguro das emoções masculinas. Nós ditávamos o mundo e estabelecíamos as regras de acordo com a
15 nossa objetividade. Fora da intimidade do casal ou da família, não havia espaço para o vasto vocabulário
16 das sensações femininas. Agora, isso mudou. As emoções das mulheres transbordaram para fora do
17 ambiente doméstico e exigem ser levadas a sério. Isso criou, para todos nós, um mundo mais justo, mas
18 muito mais complicado.

19 Antes, uma mulher chorando no trabalho era motivo de escárnio e piada. Agora, é pelo menos tão
20 sério quanto um cara esbravejando. Chefes perplexos passam horas administrando mágoas, inseguranças e
21 ressentimentos que não são capazes de entender. É um mundo novo de sutilezas e sensibilidades que se
22 impôs, a despeito da resistência dos homens. Se pudessem, eles diriam ___ mulheres que parassem de mi-
23 mi-mi e voltassem ao trabalho, mas não podem. Elas conquistaram o direito de ser elas mesmas durante o
24 expediente. Portanto, há que sentar, ouvir, conversar e acomodar sentimentos que aos homens,
25 frequentemente, parecem exagerados e injustos, mas que se tornaram parte da realidade. Os homens - ao
26 menos esta geração de homens - não compreendem, apenas aceitam. Este é outro motivo pelo qual as
27 mulheres tendem ___ prosperar nas organizações modernas. Elas compreendem, e compreensão tornou-se
28 essencial a qualquer projeto.

29 Fora do trabalho, quando as pessoas não têm obrigação de se entender, as coisas se tornaram
30 ainda mais difíceis. As mulheres querem colocar seus sentimentos na mesa e nós, homens, reagimos. Não é
31 apenas o fiu-fiu que incomoda as moças nas calçadas e que os homens terão de aprender a suprimir. Há
32 coisas mais sutis que emperram o convívio.

33 É óbvio que um mundo que responda aos sentimentos de metade da população é um mundo mais
34 justo. É evidente, até para o mais xucro dos homens, que não se pode construir uma sociedade, uma
35 família ou uma relação de casal harmônicas ignorando a sensibilidade feminina. As mulheres oferecem ao
36 planeta um olhar sutil, capaz de distinguir matizes de sentimentos e sensações que a cultura masculina não
37 percebe. Com esse olhar ganha-se inteligência, amplitude e profundidade, mas não só. Há confusão
38 também.

39 A cultura em preto e branco do universo masculino funciona como proteção. A objetividade é um
40 escudo contra o caos dos sentimentos. A cultura feminina permite a expressão de um leque maior de
41 emoções e a percepção de um mundo mais complexo em seus detalhes, mas tem um lado B. Como se
42 desliga a sensibilidade quando ela começa a se tornar autodestrutiva? Como se faz para lidar de forma
43 organizada com o mundo exterior quando uma multidão de vozes contraditórias grita dentro de nós,
44 exigindo expressão?

45 O silêncio interior dos homens é uma coisa triste – como as lágrimas das mulheres frequentemente
46 me fazem notar - mas ele permite ouvir o mundo com mais clareza. É um mundo mais simples esse que os
47 homens habitam e enxergam, mas ele vem funcionando há milênios. Agora, as mulheres nos propõem o
48 desafio de fazer funcionar um mundo mais parecido com elas – com mais cores, mais dimensões, mais
49 detalhes e muitos mais sentimentos. Não vai ser fácil, mas não há alternativa. O mundo que os homens
50 construíram ___ sua imagem e semelhança está ruindo. É necessário começar um mundo novo.

(Ivan Martins – Revista Época, 9 de março de 2016 – disponível em <http://www.epoca.globo.com> - adaptação)

01. Analise as afirmações abaixo, em relação ao assunto discutido no texto.

I. De acordo com os argumentos empregados pelo autor, os homens têm uma capacidade menor do que as mulheres para expressar sentimentos.

II. O autor coloca a diferença na forma de sentir como uma das possíveis justificativas para os desentendimentos entre homens e mulheres.

III. O autor vê de forma negativa a necessidade de aceitação das emoções femininas em ambientes de trabalho.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) Apenas II e III.

02. Considerando os argumentos expostos no texto, assinale a alternativa que **NÃO** representa uma mudança de comportamento frente às emoções femininas.

- a) "As emoções das mulheres transbordaram para fora do ambiente doméstico e exigem ser levadas a sério" (l. 16-17).
- b) "Antes, uma mulher chorando no trabalho era motivo de escárnio e piada. Agora, é pelo menos tão sério quanto um cara esbravejando." (l. 19-20).
- c) "É um mundo novo de sutilezas e sensibilidades que se impôs, a despeito da resistência dos homens" (l. 21-22).
- d) "Não é apenas o fiu-fiu que incomoda as moças nas calçadas e que os homens terão de aprender a suprimir." (l. 30-31).
- e) "O silêncio interior dos homens é uma coisa triste" (l. 45).

03. Considerando o acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das linhas 22, 27 e 50.

- a) às – à – a.
- b) às – a – à.
- c) às – à – à.
- d) as – a – a.
- e) as – à – a.

04. Considerando o emprego correto do acento gráfico em Língua Portuguesa, analise as assertivas a seguir:

I. Na linha 17, a omissão do acento gráfico da palavra "sério" geraria vocábulo inexistente em Língua Portuguesa.

II. Na linha 20, a supressão do acento gráfico da palavra "mágoas" geraria vocábulo pertencente à classe gramatical diferente da do vocábulo que o originou.

III. Na linha 29, a supressão do acento gráfico da palavra "têm" geraria vocábulo pertencente à mesma classe gramatical da do vocábulo que o originou.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) Apenas II e III.

05. Considerando o emprego dos sinais de pontuação, analise as assertivas a seguir:

I. O emprego dos travessões nas linhas 01-02 deve-se à separação de expressão explicativa e eles

poderiam ser substituídos por vírgulas sem prejuízo da correção gramatical do período.

II. Na linha 09, o emprego do ponto de interrogação deve-se à ocorrência de uma interrogação indireta.

III. O emprego das vírgulas na linha 48 deve-se à enumeração de termos.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e III.
- e) Apenas II e III.

06. Assinale a alternativa na qual a classificação da oração esteja **INCORRETA**:

- a) "Enquanto elas choram" (l.04) – oração subordinada adverbial temporal.
- b) "como elas conseguem ir tão fundo e tão rápido dentro de si mesmas", (l. 08-09) – oração subordinada adverbial conformativa.
- c) "mas é possível também ter medo e raiva" (l. 10) – oração coordenada adversativa.
- d) "tão sério quanto um cara esbravejando" (l. 19-20) – oração subordinada adverbial comparativa.
- e) "e acomodar sentimentos" (l. 24) – oração coordenada aditiva.

07. Assinale a alternativa na qual o vocábulo esteja empregado como conjunção integrante.

- a) "que me impedisse de expressar" (l. 03).
- b) "que terminou recentemente" (l. 13).
- c) "que não são capazes de entender" (l. 21).
- d) "que parassem de mi-mi-mi" (l. 22-23)
- e) "que responda aos sentimentos" (l. 33).

08. Desconsiderando o emprego de maiúsculas e minúsculas, o vocábulo "se" (l.01, 1ª ocorrência) insere a ideia de _____ e poderia ser substituído por _____, desde que _____ alterações no período.

- a) Condição – caso – se façam.
- b) Condição – caso – não se façam.
- c) Causa – caso – se façam.
- d) Causa – caso – não se façam.
- e) Conclusão – caso – se façam.

09. Assinale a alternativa na qual o vocábulo possa substituir a palavra "algaravia" (l. 05) sem alterar o sentido do período (desconsidere o emprego de palavras masculinas ou femininas).

- a) Organização.
- b) Ordenamento.
- c) Confusão.
- d) Cruzamento.
- e) Coalisão.

10. Considerando a concordância verbal, analise as assertivas a seguir:

I. Na linha 13, em “Houve um tempo”, caso alterássemos a expressão “um tempo” para “tempos”, o verbo haver sofreria alteração.

II. Na linha 14, a forma verbal “estabelecíamos” mantém relações de concordância com o pronome pessoal “nós” (l. 14).

III. Na linha 37, caso substituíssemos a palavra “olhar” por sua forma plural, a forma verbal “ganha-se” deveria ser alterada.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas I e III.
- e) Apenas II e III.

LEGISLAÇÃO

11. Assinale a alternativa correta, com base nos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal, que tratam dos princípios constitucionais quanto à saúde:

a) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

b) A União aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 25% (vinte e cinco por cento).

c) A assistência à saúde é proibida à iniciativa privada.

d) É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

e) A destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos será permitida na forma da lei.

12. A Lei Orgânica do Município de Porto Alegre prevê preceitos sobre a Saúde. À luz desses preceitos, assinale a alternativa correta.

I. A saúde é direito de todos e dever do Poder Público, cabendo ao Município, com a cooperação apenas da União, prover as condições indispensáveis a sua promoção, proteção e recuperação.

II. As ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Município sua normatização e controle, devendo a execução ser feita única e exclusiva pelos órgãos públicos.

III. É possível a cobrança ao usuário pela prestação de serviços de assistência à saúde, mantidos pelo Município, desde que os serviços sejam contratados ou conveniados pelo Sistema Único de Saúde.

IV. Fica expressamente vedada, nos serviços de saúde, no âmbito do Município, qualquer experimentação de substâncias, drogas ou meios anticoncepcionais que atentem contra a saúde, não sejam de pleno conhecimento dos usuários, nem

sofram a fiscalização do Poder Executivo e dos órgãos representativos da população.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I, II e III.
- b) Apenas I, II e IV.
- c) Apenas IV.
- d) Todas estão corretas.
- e) Nenhuma está correta.

13. A lei Orgânica do Município de Porto Alegre arrola algumas competências do Município quanto à Saúde, artigo 161.

I. Direção do Sistema Único de Saúde no Município.

II. Prestação de serviços de atendimento à saúde da população.

III. Elaboração e atualização do Plano Municipal de Saúde.

IV. Administração do Fundo Municipal de Saúde.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I, II e III.
- b) Apenas I, II e IV.
- c) Apenas I.
- d) Todas estão corretas.
- e) Nenhuma está correta.

14. Conforme disciplina a Lei Complementar Municipal n. 478/2002, que prevê regras sobre o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Porto Alegre (RPPS), assinale a alternativa correta.

a) A estrutura básica do PREVIMPA é constituída por: I - Conselho de Administração; II - Conselho Fiscal; III - Diretoria Executiva; e, IV Conselho dos Contribuintes.

b) São beneficiários do RPPS os segurados e seus dependentes.

c) O casamento é uma das causas para a perda da condição de segurado do RPPS.

d) A criança e o adolescente sob guarda judicial não se equiparam aos filhos, enquanto perdurar a guarda.

e) A inscrição dos dependentes junto ao PREVIMPA ocorrerá independente de solicitação do segurado, qualificando-os para fins de benefícios previdenciários, na forma disciplinada em regulamento.

15. A Lei Complementar Municipal n. 478/2002, é considerada o Estatuto Previdenciário dos Municipários, com base nas seguintes proposições escolha a resposta correta.

I. O RPPS compreende os seguintes benefícios quanto ao segurado: a) aposentadoria; b) auxílio-doença; c) salário-maternidade; e d) salário-família.

II. O Estatuto Previdenciário prevê os seguintes benefícios quanto ao dependente: a) pensão por morte; e b) auxílio-reclusão.

III. Acidente em serviço é aquele ocorrido no exercício do cargo, que se relacione, direta ou indiretamente, com as atribuições deste, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a

morte ou a perda ou a redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

IV. A doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade não se equipara a acidente em serviço, para efeitos desta Lei.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I, II e III.
- b) Apenas I, II e IV.
- c) Apenas I e II.
- d) Todas estão corretas.
- e) Nenhuma está correta.

16. Conforme disposições da Lei Complementar Municipal n. 133/85 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Porto Alegre), assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) São competentes para dar posse: I - o Prefeito, aos titulares de postos de sua imediata confiança; II - o órgão de recursos humanos, nos demais casos.
- b) A lotação é a distribuição dos funcionários nas Repartições em que devam ter exercício, devendo ser feita, sempre que possível, à relação entre as características demonstradas pelo funcionário, as atribuições do cargo e as atividades do órgão. Podendo, ainda, ser feita a pedido ou "ex-officio", no interesse da Administração.
- c) O exercício terá início no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da posse.
- d) Dependerá da autorização do Prefeito, o afastamento do servidor para estudo ou missão científica, cultural ou artística.
- e) Considera-se serviço noturno o realizado entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e às 5 (cinco) horas do dia seguinte e a hora de trabalho noturno será computada como de 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.

17. Considerando os deveres dos servidores públicos previstos na Lei Complementar n. 133/85, assinale a alternativa correta.

- I. Manter assiduidade.
- II. Ser pontual.
- III. Manter espírito de cooperação e solidariedade com os colegas de trabalho.
- IV. Respeitar seus superiores hierárquicos e acatar suas ordens, mesmo quando manifestamente ilegais.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e IV.
- b) Apenas I, II e III.
- c) Apenas II, III e IV.
- d) Todas estão corretas.
- e) Nenhuma está correta.

18. Conforme disposições do Estatuto do Servidor Público Municipal, Lei Complementar n. 133/85, no que se refere às proibições, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Ao Funcionário Público é proibido retirar, modificar ou substituir, sem prévia permissão da autoridade

competente, qualquer documento ou objeto existente na repartição.

b) Segundo o Estatuto, o servidor não pode se retirar do recinto de trabalho, sem prévia licença do seu superior imediato e nem deixar de comparecer ao serviço sem causa justificável.

c) O Funcionário não poderá assediá-los, com a finalidade de obter vantagem sexual, implicando dano ao ambiente de trabalho, à evolução na carreira profissional ou à eficiência do serviço.

d) É proibido praticar assédio moral contra seus superiores, por meio de atos ou expressões reiteradas que tenham por objetivo atingir a dignidade desses ou criar condições de trabalho humilhantes ou degradantes para esses, abusando de autoridade conferida pela posição hierárquica.

e) É proibido ao Servidor Público cometer a pessoas estranhas à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargos que competem a si ou a seus subordinados.

19. Analise as assertivas abaixo e, à luz dos preceitos do Plano de Carreira dos Servidores Públicos, Lei n. 6.309/88, assinale a alternativa correta.

I. Quando o indicado para o cargo em comissão for funcionário efetivo municipal, não poderá optar pelo provimento sob a forma de função gratificada de mesmo nível.

II. Somente concorrerão à ascensão funcional, por progressão os funcionários que estejam efetivamente no exercício das atribuições próprias do cargo ou função gratificada.

III. Os detentores dos cargos de Médico Especialista e Médico Clínico-Geral, enquanto convocados para: I - Regime Suplementar de Trabalho (RST) ou RTI terão direito a uma gratificação de 50% (cinquenta por cento), calculada sobre seu vencimento básico; II - RDE, terão direito a uma gratificação de 100% (cem por cento), calculada sobre seu vencimento básico.

IV. Os funcionários lotados e em exercício na Coordenadoria Geral do Sistema Municipal das Urgências, no Hospital de Pronto Socorro, nos Pronto Atendimentos Cruzeiro do Sul e Bom Jesus, Hospitais e Pronto Atendimentos que vierem a ser criados pelo Município de Porto Alegre ou que passem à responsabilidade gerencial desse, em decorrência da municipalização da saúde, terão direito a uma gratificação correspondente a 110% (cento e dez por cento) do valor básico inicial do respectivo cargo, sobre a qual não incidirão quaisquer gratificações ou vantagens.

Quais estão corretas?

- a) Apenas II e III.
- b) Apenas II, III e IV.
- c) Apenas I, II e III.
- d) Todas estão corretas.
- e) Nenhuma está correta.

20. Analise as assertivas abaixo, com base na Lei n. 8080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços

correspondentes, e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício e na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- b) O dever do Estado de garantir a saúde não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- c) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde.
- d) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- e) A Lei Federal n. 8080/90 regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, apenas por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Novembro azul é um movimento que surgiu em alguns países no sentido de conscientizar sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce de doenças que atingem a população masculina. No Brasil, a principal causa de mortalidade dos homens na faixa etária de 20 até 59 anos é:

- a) Acidentes vasculares.
b) Neoplasias.
c) alcoolismo
d) Causas externas (violência, acidentes).
e) Asma.

22. Porto Alegre detém taxas elevadas de mortalidade por AIDS, apresentando, inclusive, mais que o dobro de casos do que o Estado do Rio Grande do Sul. Atualmente, entre as diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para o manejo da infecção do HIV em adultos está a recomendação de:

- a) Iniciar o tratamento de terapia antiretroviral para todas as pessoas vivendo com HIV/AIDS (PVHA) independente da contagem de linfócitos CD4.
b) Recomendar tratamento somente para pessoas sintomáticas com CD4 <500 cópias/ ml.
c) Indicar tratamento somente para PVHA apresentando comorbidades com TBC, HCV.
d) Recomendar tratamento somente para aqueles pacientes com linfócitos CD4 < 500 cópias/ml e carga viral <150 células.
e) Indicar tratamento exclusivamente para PVHA e comorbidades associadas à baixa imunidade como herpes zoster e histoplasmoze

23. A dengue, associada a hábitos populacionais e falta de saneamento básico, é uma doença que passou a apresentar-se como um grande desafio de saúde pública no Brasil. No entanto, os óbitos pela doença são considerados absolutamente evitáveis com a adoção de medidas de baixa densidade tecnológica. A identificação dos casos suspeitos é de vital importância, embora se assemelhem, inicialmente, a várias patologias. Cabe ao Médico de Família ter sempre presente, no mínimo, quais são os sintomas e sinais da apresentação clássica da dengue, que costumam ser:

- a) Febre baixa e arrastada no fim da tarde.
b) Diarreia sanguinolenta.
c) Dor retroorbitária.
d) Hipertensão aguda.
e) Derrames articulares.

24. A coleta para cultura de Streptococcus do grupo B com swab vaginal e anal é recomendada de forma sistemática para todas as gestantes entre 35 e 37 semanas de gestação, para determinar a colonização no trato genital e intestinal, seguindo o Protocolo de Assistência ao Pré-Natal de Baixo Risco da Prefeitura de Porto Alegre. Frente a isso, há também a seguinte recomendação:

- a) Tratar o parceiro logo que se tenha conhecimento de resultado positivo em alguma das coletas da gestante.
b) Tratar a gestante quando tiver história positiva para streptococcus do grupo B em gestação anterior.
c) Não fazer nenhum tratamento durante o pré-natal.
d) Tratar todas as gestantes que apresentam vaginose bacteriana associada ao streptococcus do grupo B no swab vaginal ou anal.
e) Administrar a vacina do Streptococcus B em todas as gestantes para tentar bloquear o avanço da doença.

25. A nefropatia diabética é uma complicação microvascular da diabetes associada com morte prematura por uremia e problemas cardiovasculares. É a principal causa de doença renal crônica em pacientes que ingressam em serviços de diálise. A nefropatia diabética é classificada em fases: normoalbuminúria, microalbuminúria e macroalbuminúria. Diante disso, podemos afirmar que:

- a) O rastreamento da nefropatia diabética deve começar após cinco anos do diagnóstico.
b) O rastreamento deve iniciar, preferencialmente, pela dosagem de microalbuminúria em amostra isolada de urina.
c) A progressão dos estágios da nefropatia é contínua, não havendo possibilidade de regressão da doença, mesmo após iniciado tratamento.
d) A excreção de albumina não é influenciada pelo uso de medicações, sendo irrelevante seu uso pelo paciente avaliado para nefropatia.
e) Todo paciente diabético que se suspeite ou confirme nefropatia deve ser avaliado pelo nefrologista.

26. Apesar de não ser rotina, na Atenção Básica, atender casos de urgência e emergência, inevitavelmente costumam chegar à Unidade Básica de Saúde (UBS) situações que necessitam manejo. Casos de hiperglicemia diagnosticados por HGT apresentam certa frequência, devendo o médico da UBS ter domínio sobre seu tratamento. Frente a isso, podemos afirmar que:

- a) Pessoas com glicemia > 250 mg/dl, sugerido por HGT, cetonúria ou hálito cetônico, desidratação ou vômitos têm indicação de serem encaminhadas ao serviço de emergência.
- b) Todo paciente que chegar à UBS com HGT sugestivo de glicemia maior de 250 mg/dl deve, imediatamente, ser encaminhado à emergência para melhor avaliação.
- c) Paciente com HGT maior de 250 mg/dl, assintomático, não deve ser hidratado na UBS pelo risco de piora da descompensação diabética.
- d) Pacientes que apresentam cronicamente HGT maior de 250 mg/dl devem ser encaminhados à emergência para baixar a glicemia em até 24 horas.
- e) Casos de pacientes com HGT maior de 250 mg/dl não procuram a Atenção Básica.

27. A tuberculose continua a merecer especial atenção dos profissionais de saúde e da sociedade como um todo. Obedece a todos os critérios de priorização de um agravo em Saúde Pública. Tratar prontamente os casos de Tuberculose (TBC) ainda é a principal medida para controle da doença. Neste sentido, o Ministério da Saúde recomenda que em paciente suspeito de TBC, a indicação da primeira coleta para o escarro seja:

- a) Após 30 dias da suspeita, se ainda houver tosse.
- b) Coletada na primeira consulta e no retorno à UBS em 30 dias.
- c) Coletada após higiene bucal com antisséptico e escovação dental adequada.
- d) Coletada na primeira suspeita para não haver risco de perder oportunidade diagnóstica.
- e) Na manhã do dia seguinte, em consulta ou visita domiciliar.

28. Pessoas com doenças da tireoide são frequentes na Atenção Básica, principalmente hipotireoidismo. Na maioria das vezes é causado por uma inflamação denominada Tireoidite de Hashimoto, uma disfunção autoimune. O hipotireoidismo também afeta recém-nascidos, nesses casos, o problema é diagnosticado pelo conhecido "teste do pezinho" e o tratamento deve ser iniciado imediatamente. Diante disso, podemos dizer que **NÃO** é correto:

- a) Recomendar tratamento para pacientes com hipotireoidismo subclínico persistente e com níveis séricos de TSH \geq 10 mIU/L.
- b) Hipotireoidismo subclínico é duas a três vezes mais frequente nos portadores de hipercolesterolemia.
- c) Recomendar para pacientes com níveis séricos do TSH < 10 mIU/L, sem comorbidades e em idosos maiores de 65 anos, seguimento sem tratamento farmacológico com reavaliações semestrais ou anuais.

- d) Hipertireoidismo subclínico exógeno por doses excessivas de levotiroxina, principalmente em pacientes idosos, eleva o risco de fibrilação atrial.
- e) Administração de levotiroxina junto à primeira alimentação da manhã. Não sendo influenciada sua absorção pela administração de medicações concomitantes.

29. Asma é uma doença inflamatória crônica da via aérea que se caracteriza por limitação do fluxo aéreo e responsividade aumentada de traqueia e brônquios a vários estímulos, manifestando-se por dispneia, aperto no peito, sibilância e tosse. O quadro principal costuma ser de obstrução, mas prolonga-se para inflamação com edema de mucosa e aumento da secreção brônquica. Em virtude da prevalência, também na Atenção Básica, de casos de asma, cabe ao generalista saber, **EXCETO**:

- a) Ao primeiro sinal de crise, como tosse irritativa, seca, curta e improdutiva, o paciente deve ser orientado a iniciar o beta2-agonista de ação curta.
- b) Em doses médias e baixas a corticoterapia inalatória tem absorção e efeito sistêmico insignificante.
- c) Os beta2-agonistas por via oral, em forma de xarope, são a melhor alternativa para pacientes com crises eventuais, pois são mais baratos e mais eficazes nestas situações.
- d) Estima-se que 60% dos casos de asma sejam intermitentes ou persistentes leves, 25% a 30% moderados e 5% a 10% graves. Podendo a maioria dos casos acompanhar na Atenção Básica.
- e) Em alguns pacientes asmáticos, a crise é desencadeada ou agravada por associação com rinosinusite alérgica, refluxo ou sinusite bacteriana, precisando ser identificados e controladas para obtenção de resposta ao tratamento.

30. Parotidite infecciosa é uma doença viral aguda, caracterizada por febre e aumento de volume de uma ou mais glândulas salivares, geralmente parótidas, às vezes, glândulas sublinguais ou submandibulares. Sobre isso podemos afirmar que está correto, **EXCETO**:

- a) O vírus pode ser encontrado na urina até 14 dias após o início da doença.
- b) Pode causar meningite, pancreatite, tireoidite.
- c) Entre o diagnóstico diferencial está obstrução de ductos parotídeos por cálculos salivares.
- d) As provas sorológicas não são necessárias na rotina.
- e) Não há vacinas disponíveis até o momento.

31. Constipação intestinal é uma preocupação frequente em mães de lactentes. Como patologia é rara em criança aleitada no peito. Considera-se constipação intestinal a dificuldade para evacuar ou a evacuação de fezes secas, duras ou volumosas. Muitos recém-nascidos e lactentes normais ficam dias sem evacuar devido, principalmente:

- a) Pela presença de doença de Hirschsprung.
- b) Por constipação intestinal funcional.
- c) Diminuição da ingesta de aleitamento materno.

- d) Presença de estenose retal.
e) Por fissuras anais.

32. Considere alguns conceitos básicos em epidemiologia clínica e assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso:

() Quanto às propriedades de um teste diagnóstico, pode-se dizer que é mais útil para um clínico o “resultado negativo de um teste sensível” e o “resultado positivo de um teste específico”.

() Os indicadores de saúde são medidas (proporções, taxas, razões) que procuram sintetizar o efeito de determinantes de natureza variada (sociais, econômicos, ambientais, biológicos, etc.) sobre o estado de saúde de uma determinada população.

() Incidência é a frequência de casos novos de uma determinada doença, ou problema de saúde, oriundos de uma população sob risco de adoecimento, ao longo de um determinado período de tempo.

Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a sequência de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo.

- a) F, F, V.
b) F, V, V.
c) V, V, V.
d) V, F, V.
e) F, V, F.

33. Relacione os tipos de estudos às características dos delineamentos dos estudos epidemiológicos.

- 1 – Estudo Transversal.
2 – Estudo de Corte.
3 – Estudo de Caso e Controle.
4 – Estudo Ecológico.

() São estudos observacionais; os indivíduos são observados ao longo do tempo para avaliar a incidência de doença ou outro desfecho de interesse; geralmente, são caros e pouco eficazes para doenças raras.

() São estudos observacionais; geralmente de baixo custo; útil para estudo de doença rara e parte da identificação de indivíduos com a doença em estudo (caso) e outro grupo de indivíduos sem a doença (controle).

() Também é chamado de seccional; a exposição e a condição de saúde são avaliadas ao mesmo tempo e são bons para avaliar prevalência.

() A unidade de análise é uma população ou um grupo de pessoas pertencentes a uma área definida.

Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a sequência de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo.

- a) 3 – 2 – 1 – 4
b) 4 – 2 – 1 – 3
c) 2 – 4 – 3 – 1
d) 2 – 3 – 1 – 4
e) 3 – 2 – 4 – 1

34. Segundo o Código de Ética Médica, são corretas as seguintes afirmações, **EXCETO**:

a) Para exercer a Medicina com honra e dignidade, o médico necessita ter boas condições de trabalho e ser remunerado de forma justa.

b) O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional.

c) As relações do médico com os demais profissionais, devem basear-se no respeito mútuo, na liberdade e na independência de cada um, buscando sempre o interesse e o bem-estar do paciente.

d) Recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.

e) É permitido ao médico usar formulários de instituições públicas para prescrever ou atestar fatos verificados na clínica privada.

35. Com relação aos conceitos que regem a organização dos serviços em Atenção Primária à Saúde (APS), considere as seguintes afirmativas:

I. Na APS, a forma de organização dos serviços deve levar em consideração a perspectiva da população, em relação ao seu perfil clínico e epidemiológico, bem como promover a participação dos usuários, através do controle social.

II. A APS realiza serviços preventivos, curativos e de promoção à saúde, sendo as ações de reabilitação somente de responsabilidade da atenção secundária e terciária.

III. A equidade é um princípio norteador das ações em saúde na APS, de forma que promove distribuição igualitária do cuidado, independente das necessidades do indivíduo.

IV. A integralidade do cuidado na APS determina que os serviços sejam capazes de atender às diversas necessidades de saúde, incluindo o encaminhamento para atenção secundária e terciária, quando necessário.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I, III e IV.
b) Apenas III e IV.
c) Apenas II e III.
d) Apenas I e IV.
e) Todas estão corretas.

36. O Instituto Nacional do Câncer (INCA), órgão do Ministério da Saúde, é responsável pelo Programa Nacional do Controle do Tabagismo. O tratamento do paciente tabagista na rede do SUS é articulado nos diversos níveis de atenção. As afirmativas abaixo são referentes às abordagens terapêuticas do paciente tabagista realizadas na APS.

I. Avaliação clínica, abordagem cognitivo-comportamental e, caso necessário, terapia medicamentosa, fazem parte da terapêutica do paciente tabagista.

II. Os tratamentos com reposição de nicotina são indicados por ajudarem na diminuição dos sintomas

da síndrome de abstinência. Esses medicamentos são sempre contraindicados aos pacientes que já tiveram algum evento isquêmico no passado.

III. Adesivo de nicotina, goma de mascar de nicotina e Cloridrato de Bupropiona são medicamentos que podem ser usados no tratamento do paciente que deseja parar de fumar.

IV. Sabe-se que até mesmo uma intervenção breve pode ajudar a aumentar a taxa de cessação do tabagismo. Fazem parte do aconselhamento ao paciente: preparar o fumante para soluções de seus problemas; estimular habilidades para resistir às tentações de fumar; preparar para prevenir a recaída e preparar o fumante para lidar com o stress.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I, III e IV.
- b) Apenas II, III e IV.
- c) Apenas II e III.
- d) Apenas II e IV.
- e) Todas estão corretas.

37. Referente ao Transtorno Depressivo Maior, qual das afirmativas abaixo é **INCORRETA**?

- a) A depressão é uma condição médica muito prevalente em cuidados primários, estando muito associada à incapacitação funcional.
- b) O tratamento da fase aguda tem como objetivo a diminuição ou eliminação dos sintomas. A continuação do tratamento tem por meta manter a melhora obtida, evitando recaídas. A fase de manutenção, de longa duração, é recomendada para pacientes com maiores chances de recorrência.
- c) Para combinação de antidepressivos, é mandatório associar fármacos com perfil neuroquímico iguais.
- d) A escolha do medicamento a ser prescrito deve levar em consideração diversos fatores como, por exemplo, condições clínicas, aceitação, tolerância, bem como fatores sociais, de acesso ao medicamento e custo.
- e) Antes de indicar um tratamento farmacológico é necessário avaliar a presença de risco de suicídio ou outros riscos que indiquem a necessidade de internação.

38. Referente ao Transtorno do Pânico (TP), qual das afirmativas abaixo é verdadeira?

- a) O melhor tratamento do TP é aquele que inclui a terapia farmacológica e a psicoterapia. A terapia cognitivo-comportamental ajuda a diminuir a ansiedade antecipatória, a hipervigilância, a esquiva fóbica e corrigir diversas crenças disfuncionais.
- b) Os IRSs (Inibidores da Receptação da Serotonina) não são recomendados para tratamento do TP, pois somente são eficazes se o paciente tiver depressão associada.
- c) Dentre os benzodiazepínicos, o clonazepan não deve ser usado para tratamento da crise de pânico, pois tem início de ação muito demorado.
- d) Sempre se usa benzodiazepínicos na fase inicial do tratamento, para diminuir a ansiedade e as crises de pânico.

e) A imipramina e a clomipramina são ineficazes no tratamento do TP.

39. Com relação ao corrimento vaginal, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) O corrimento vaginal é uma síndrome comum, que ocorre, principalmente, na idade reprodutiva, podendo ser acompanhado de prurido, irritação local e/ou alteração de odor.
- b) O corrimento vaginal ocorre por múltiplos agentes etiológicos, que incluem: Vaginose bacteriana (*Prevotella* sp. *G. vaginalis*, *Ureaplasma* sp. e *Mycoplasma* sp.); Candidíase vulvovaginal (geralmente *C. albicans* e *C. glabrata*) e Tricomoníase: causada por *T. vaginalis*. Sendo apenas a última considerada uma infecção sexualmente transmissível.
- c) Na candidíase vaginal, os parceiros sexuais não precisam ser tratados, exceto os sintomáticos. São ótimas opções terapêuticas o Miconazol e Nistatina creme vaginal.
- d) A anamnese como método isolado é capaz de orientar o diagnóstico das queixas de corrimento vaginal, não sendo necessário a realização do exame físico.
- e) Na Vaginose bacteriana, o tratamento deve ser recomendado para mulheres sintomáticas, grávidas, na presença de comorbidades ou com potencial risco de complicações.

40. Com relação às doenças sexualmente transmissíveis, é **INCORRETA** a afirmativa:

- a) As principais complicações da cervicite por clamídia e gonorreia, quando não tratadas, incluem: dor pélvica, DIP, gravidez ectópica e infertilidade.
- b) No tratamento do herpes genital, o uso de antivirais é contraindicado na gestação.
- c) A oftalmia neonatal, complicação devido à infecção materna pela *N. gonorrhoeae* não tratada na gestação, definida como conjuntivite purulenta do recém-nascido, ocorre no primeiro mês de vida e pode levar a cegueira. Por isso a doença deve ser tratada imediatamente, para prevenir dano ocular.
- d) Uma ótima opção terapêutica para o tratamento da cervicite por clamídia e gonorreia é o uso de Ciprofloxacina 500 mg, VO, dose única, MAIS Azitromicina 500 mg, 2 comprimidos, VO, dose única; OU Ceftriaxona 500 mg, IM, dose única, MAIS Azitromicina 500 mg, 2 comprimidos, VO, dose única.
- e) A sífilis primária, também conhecida como "cancro duro", ocorre após o contato sexual com o indivíduo infectado. A primeira manifestação é caracterizada por uma úlcera, geralmente única, indolor, com base endurecida e fundo limpo, rica em treponemas e que ocorre no local de entrada da bactéria.

41. Uma adequada assistência pré-natal e ao parto proporcionam melhores indicadores de saúde materna e neonatal, devido ao potencial de diminuir as principais causas de morbidade e mortalidade da mãe e do bebê. Com relação ao atendimento de pré-natal, assinale (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas.

() A ausculta dos batimentos cardíacos fetais com o Sonar-Doppler deve sempre estar presente após a 6ª semana de gestação.

() A coleta para cultura de Streptococcus do grupo B com swab vaginal e anal é recomendada de forma sistemática para todas as gestantes no primeiro trimestre. Essa recomendação se deve à necessidade de tratamento o mais precoce possível, durante o pré-natal.

() Se a gestante for Rh negativo e o genitor for Rh positivo, solicitar o Coombs Indireto (CI) na 1ª consulta de pré-natal. Se CI negativo, repetir entre 24-28 semanas e, após a cada 4 semanas. Se positivo, referenciar para o pré-natal de alto risco imediatamente.

() Na ocorrência de dois ou mais episódios de ITU na gestação, deve-se prescrever profilaxia antimicrobiana.

() O Ministério da Saúde preconiza o uso de ácido fólico 5mg/dia, o qual deve ser iniciado 60 a 90 dias antes da concepção e continuar durante todo primeiro trimestre de gestação. Essa medida tem forte efeito protetor contra defeitos abertos do tubo neural (espinha bífida, anencefalia e encefalocele).

Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a sequência de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo.

- a) F, F, V, V, V.
- b) F, V, V, V, V.
- c) V, V, F, F, V.
- d) V, F, F, F, V.
- e) F, V, V, F, F.

42. Quanto aos métodos contraceptivos, assinale a alternativa **ERRADA**.

- a) Os anticoncepcionais orais podem ser iniciados imediatamente pós-aborto.
- b) A laqueadura tubária, por ser um procedimento cirúrgico, garante proteção contra gestação em 100%, ou seja, a taxa de falha é 0% em um ano.
- c) Não há necessidade de período de pausa após uso prolongado de anticoncepcionais orais, sendo a reversibilidade do método independente do tempo de uso.
- d) O DIU pode ser colocado a qualquer momento do ciclo menstrual, desde que exista certeza de que a mulher não esteja grávida, sendo preferível no período menstrual.
- e) Os anti-retrovirais podem potencialmente, aumentar ou diminuir o efeito dos contraceptivos hormonais. Recomenda-se o uso de condom tanto para a prevenção da transmissão do HIV como para a segurança dos métodos contraceptivos hormonais.

43. Em relação ao câncer de mama, está **INCORRETO** afirmar:

- a) O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele não melanoma.
- b) O Ministério da Saúde recomenda a implementação de estratégias de conscientização para o diagnóstico precoce do câncer de mama, devendo envolver mensagens sobre conscientização

do próprio corpo, conhecimento de aspectos normais das mamas e suas variações ao longo do ciclo menstrual e do envelhecimento, bem como mensagens sobre os sinais de alerta para o câncer de mama.

c) A anamnese e o exame clínico das mamas estão entre os pilares da investigação diagnóstica de pacientes com queixas mamárias, tanto em uma primeira avaliação na Atenção Primária quanto em consultas em serviços de referência para diagnóstico de doença mamária.

d) Qualquer nódulo mamário em mulheres com mais de 50 anos; retração na pele da mama; e descarga papilar sanguinolenta unilateral, são alterações que devem ser investigadas por serem suspeitas de malignidade.

e) Hábitos como praticar atividade física, alimentação saudável, amamentação e consumo baixo de bebidas alcoólicas não têm influência protetora no câncer de mama.

44. Considere as seguintes afirmações com relação à doença inflamatória pélvica (DIP):

I. Os sintomas de sangramento vaginal anormal em pouca quantidade (spotting), dispareunia, corrimento vaginal, dor pélvica ou dor no abdome inferior, além de dor a mobilização do colo do útero ao toque, podem estar presentes na DIP.

II. Gravidez ectópica, apendicite aguda, infecção do trato urinário, litíase ureteral, rotura de cisto ovariano e endometriose, devem ser considerados como diagnósticos diferenciais de DIP.

III. Deve-se iniciar imediatamente o tratamento antimicrobiano nas mulheres jovens, sexualmente ativas, com queixa de desconforto ou dor pélvica, e que preencham os critérios clínicos para DIP. O tratamento ambulatorial, aplica-se a mulheres que apresentam quadro clínico leve e exame abdominal e ginecológico sem sinais de pelvipertonite.

IV. O tratamento de primeira escolha para a DIP inclui o uso de Ceftriaxona 500 mg, IM, dose única MAIS Doxiciclina 100mg, 1 comprimido, VO, 2xdia, por 14 dias. O uso do Metronidazol está contraindicado, pois não apresenta benefício a este esquema terapêutico.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I, II e IV.
- b) Apenas II e IV.
- c) Apenas I, II e III.
- d) Apenas II, III e IV.
- e) Todas estão corretas.

45. Considere as afirmativas abaixo:

I. O tratamento da celulite e da erisipela pode ser realizado com penicilina procaína 600.000U IM de 12/12 horas por 10 dias.

II. A ceratose seborreica é um tipo de tumor epitelial que surge geralmente na infância.

III. O molusco contagioso é causado pelo vírus Molluscum contagiosum, com pico de incidência na infância. Nos adultos, a transmissão costuma ser sexual e com lesões nos genitais.

IV. É contraindicado o uso de corticoide na dermatite atópica.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas I, II e IV.
- c) Apenas I e IV.
- d) Apenas I e III.
- e) Apenas III e IV.

46. Assinale a alternativa **INCORRETA**.

a) No glaucoma agudo o paciente pode apresentar dor ocular, diminuição da visão, fotofobia e lacrimejamento. O tratamento inicial deve ser realizado com agentes mióticos. Por não ser uma patologia de urgência, pode ser realizado encaminhamento para oftalmologista via agendamento ambulatorial.

b) A anafilaxia é uma reação alérgica sistêmica de evolução rápida. A causa principal de morte é a insuficiência respiratória e hipotensão. O tratamento de escolha é a epinefrina subcutânea ou intramuscular.

c) A trombose venosa profunda em 80% dos casos ocorre nas veias da panturrilha e tem como principal complicação a embolia pulmonar. Os principais sinais e sintomas são dor, edema, aumento da temperatura e empastamento da panturrilha.

d) Paciente com dor abdominal intensa e presença de hipotensão tem como, uma das hipóteses diagnósticas, o aneurisma de aorta abdominal em expansão.

e) Paciente com dor abdominal aguda com migração da região periumbilical para a fossa ilíaca direita, com defesa voluntária e comprometimento do estado geral deve ser encaminhado de imediato para avaliação de apendicite aguda.

47. Com relação aos indicadores de saúde de Porto Alegre, escolha a alternativa **FALSA**:

a) As hepatites do tipo C são as mais prevalentes em Porto Alegre e a faixa etária mais acometida é a de 35 a 49 anos, com 41% dos casos, e de 50 a 64 anos, com 32% dos casos. O perfil de transmissão da hepatite C vem se alterando ao longo dos anos. Até o ano de 2005 a forma de transmissão mais referida pelos pacientes foi a transfusão de sangue e hemoderivados.

b) Porto Alegre apresenta uma alta endemicidade de tuberculose, tendo uma média de 1613 casos novos/ano no período de 2001 a 2011, sob todas as formas clínicas. Já a forma pulmonar bacilífera, que é a forma transmissível da doença, tem em média no mesmo período, 594 casos novos/ano. Estes números colocam a cidade como a primeira capital de estado brasileira em incidência desta doença.

c) No ano de 2011 a incidência de casos de AIDS em menores de 5 anos de idade por 100.000, segundo raça/cor, foi para as crianças brancas 8,4%/100.000 e para as crianças negras foi de 52,4%/100.000. O resultado deste dado é reflexo da discriminação racial, que impede o acesso igualitário nas políticas públicas. Dados desiguais em relação a AIDS mantêm-se em todos os ciclos de vida.

d) Os óbitos por doenças do aparelho circulatório predominam entre pessoas do sexo masculino em todas as faixas etárias. Esta predominância se mostra mais evidente na faixa de 40 a 59 anos, com um risco 2 vezes maior para os homens.

e) Pela série histórica dos coeficientes de mortalidade por Diabete Mellitus (2000-2010), observou-se que houve uma predominância de óbitos no sexo feminino, chegando a um incremento de 21% na população feminina, na faixa etária de 60 anos de idade ou mais, considerando os coeficientes médios dos últimos cinco anos.

48. São objetivos do projeto do Acolhimento com Identificação de Necessidades em Porto Alegre, **EXCETO**:

a) Atender a todas as pessoas que procuram os serviços de saúde, viabilizando o acesso, oferecendo uma atenção oportuna, eficaz, segura e ética.

b) Ter caráter voluntário para a adesão tanto pelas equipes de saúde da Atenção Básica quanto pelos gestores municipais, a partir do pressuposto de que o seu êxito depende da motivação e proatividade dos atores envolvidos.

c) Reorganizar o processo de trabalho, revertendo a lógica da oferta e da demanda, através da priorização da clientela de maior vulnerabilidade, diminuindo as desigualdades, respeitando as necessidades dos diferentes indivíduos ou grupos populacionais.

d) Eliminar as barreiras burocrático-organizacionais, que dificultam e limitam o acesso aos serviços.

e) Tornar os ambientes internos e externos das Unidades de Saúde mais confortáveis, acolhedores e acolhedores.

49. São serviços e dispositivos da Atenção Básica de Porto Alegre, **EXCETO**:

a) Unidades de Saúde (US).

b) Consultórios na Rua (CR).

c) Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF).

d) Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

e) Unidades de Saúde Prisional.

50. Com relação ao NASF, marque a alternativa **INCORRETA**.

a) O NASF é uma equipe composta por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, que devem atuar de maneira integrada e apoiando os médicos e enfermeiros das Equipes de Saúde da Família, compartilhando as práticas e saberes em saúde nos territórios sob responsabilidade destas equipes.

b) Criado com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade, o NASF deve buscar contribuir para a integralidade do cuidado aos usuários do SUS.

c) Por intermédio da ampliação da clínica, o NASF auxilia no aumento da capacidade de análise e de intervenção sobre problemas e necessidades de saúde, tanto em termos clínicos quanto sanitários e ambientais dentro dos territórios.

d) A composição de cada um dos NASF será definida pelos gestores municipais e equipes de Saúde da Família e deve considerar os critérios de prioridade,

identificados a partir dos dados epidemiológicos, das necessidades do território e das equipes de saúde que serão apoiadas.

e) O NASF, constitui-se em retaguarda especializada para as equipes de Atenção Básica/Saúde da Família, atuando no lócus da própria AB.