



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO E INGRESSO

PROCESSO SELETIVO 03/2011
PROGRAMA DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

ENFERMEIRO
Pronto-atendimento e HMIPV

PROVA DE CONHECIMENTOS

INSTRUÇÕES GERAIS

- 1** - A prova contém 20 (vinte) questões. Verifique se ela está completa e sem falhas de impressão. Caso contrário, solicite ao Fiscal que providencie a substituição de sua prova.
- 2** - Para chamar o Fiscal, levante o braço.
- 3** - Coloque, à caneta, sua assinatura na folha de respostas.
- 4** - A folha de respostas deverá ser preenchida com caneta esferográfica azul ou preta. As elipses deverão ser preenchidas conforme modelo exposto no quadro.
- 5** - Cada questão oferece SOMENTE UMA opção correta ao questionamento proposto.
- 6** - Serão anuladas as questões que contiverem emendas, rasuras, borraduras ou qualquer assinalação diferente. Não amasse e não dobre a folha de respostas.
- 7** - Não serão permitidas consultas de nenhuma espécie.
- 8** - O candidato **NÃO** poderá fazer perguntas sobre o conteúdo das questões. Questionamentos sobre as questões deverão ser feitos em conformidade com o previsto no Edital de Abertura. As demais reclamações deverão ser encaminhadas, posteriormente à realização da prova, através de processo administrativo, via Protocolo Central.
- 9** - Não será permitido fumar durante a realização da prova, bem como utilizar ou manter ligado qualquer aparelho eletrônico.
- 10** - A prova terá duração de 1h e 30min (uma hora e trinta minutos). Não haverá tempo extra para preenchimento da folha de respostas, ou seja, no tempo de prova está incluído o tempo para preenchimento das respostas.
- 11** - O fiscal indicará quando faltar 30 (trinta) minutos para o término do tempo de prova.
- 12** - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova após 1h (uma hora) do início da mesma, **NÃO** podendo levar o caderno de provas e não será permitido seu retorno à sala após sua retirada, de acordo com os subitens 6.24 a 6.27 do Edital de Abertura.
- 13** - A prova será disponibilizada no site da Prefeitura, na segunda-feira, dia 23/05/2011.
- 14** - A divulgação do gabarito desta prova ocorrerá na terça-feira, 24/05/2011, no Diário Oficial de Porto Alegre.

1. Em um lactente com MIPAS positivo para *Influenza* deverá ser instalado qual tipo de precaução?

- a) Precaução padrão e de contato.
- b) Precaução padrão e para aerossóis.
- c) Precaução de contato e de gotículas.
- d) Precaução para aerossóis e de contato.
- e) Precaução padrão e de gotículas.

2. Crianças internadas em unidades de terapia intensiva que necessitam de ventilação mecânica por longo tempo têm indicação de traqueostomia. Assinale a alternativa que contém cuidados de enfermagem com relação à traqueostomia que devem ser observados pelo enfermeiro.

- a) Manter a perviedade, aspirando o tubo da traqueostomia conforme seja necessário, empregando técnica asséptica.
- b) Na presença de secreção espessa utilizar auxílio de ventilação manual (ambu) com máscara facial "boca nariz" para auxílio na aspiração.
- c) Não pinçar o látex para a introdução da sonda no momento da aspiração.
- d) Manter a perviedade, aspirando o tubo da traqueostomia conforme seja necessário, sem a necessidade técnica asséptica.
- e) A cânula da traqueostomia nunca deve ser trocada, pois existe o risco do fechamento do estoma.

3. Leia atentamente o texto abaixo e assinale a alternativa que corretamente preenche sua lacuna.

"Para calcular o comprimento de inserção da sonda nasogástrica, o enfermeiro antes mede externamente, usando o corpo do paciente, colocando a extremidade distal da sonda na ponta do nariz do paciente, estendendo até o lóbulo da orelha e, a seguir, estendendo até _____."

- a) a região periumbilical inferior.
- b) a ponta do apêndice xifóide.
- c) a cicatriz umbilical.
- d) a costela inferior.
- e) a clavícula.

4. Numa criança portadora de pneumonia por adenovírus, o enfermeiro deve orientar a equipe de saúde sobre a necessidade de se utilizar a precaução:

- a) padrão.
- b) de transmissão aérea.
- c) de contato.
- d) de gotículas.
- e) protetora.

5. O cateterismo vesical de demora é um procedimento necessário em muitos casos. Sobre ele, é correto afirmar que:

- a) a movimentação e mobilização do cateter, após sua inserção, é procedimento de rotina para evitar sua obstrução.
- b) o risco de infecção urinária após o cateterismo é muito maior nos pacientes do sexo masculino que nas mulheres.

c) o sistema de drenagem aberto é preferível ao fechado por diminuir o risco de infecção.

- d) para a deambulação do paciente, deve-se desconectar o equipo de drenagem no sistema fechado.
- e) se a bolsa de drenagem tiver que ficar acima do nível da bexiga do paciente, o equipo deverá ser pinçado para evitar fluxo retrógrado.

6. O vírus sincicial respiratório (VSR) pode provocar infecções pulmonares graves, principalmente em lactentes, pré-escolares e pacientes imunossuprimidos. No que diz respeito à transmissão da infecção no ambiente hospitalar, é necessário:

- a) instalar precaução aérea.
- b) manter precaução de contato.
- c) proibir a presença de visitantes.
- d) utilizar máscara n95 nas crianças.
- e) instalar precaução por aerossol.

7. Uma medicação prescrita para ser administrada sob horário em um plantão tem a seguinte apresentação: ampola de 10 mg em 5 ml. Se ao paciente for prescrito 1,5 ml endovenoso, a dose em mg que deverá ser administrada é de:

- a) 3 mg.
- b) 30 mg.
- c) 300 mg.
- d) 2,5 mg.
- e) 25 mg.

8. Um lactente com disfunção respiratória internado em uma unidade de tratamento intensiva pediátrica tem a necessidade de suporte ventilatório por ventilador mecânico e tem como um dos itens de sua prescrição médica nebulização de 3/3 horas com 20 ml de soro fisiológico 0,9% e Aerolin 3 gotas.

Ao instalar a nebulização, uma série de cuidados de enfermagem devem ser observados. Qual das alternativas abaixo não contém um desses cuidados?

- a) Verificar a permeabilidade do TE e das VAS e aspirar se necessário.
- b) Posicionar o paciente preservando o alinhamento cabeça-tronco.
- c) Conectar o nebulímetro à saída própria do aparelho na via expiratória.
- d) Acionar a tecla "nebulizador" do aparelho e verificar a presença de névoa, indicativo do bom funcionamento do sistema.
- e) Ao término, desativar a tecla "nebulizador".

9. Quando se tem dois pacientes com primeiros nomes iguais em um mesmo quarto, o enfermeiro responsável pela unidade está cometendo que tipo de infração ética?

- a) Imperícia.
- b) Imprudência.
- c) Injúria.
- d) Negligência.
- e) Omissão.

10. A hemorragia gastro intestinal baixa com eliminação de sangue vivo denomina-se:

- a) Hematoquesia.
- b) Hematemese.
- c) Hemoptise.
- d) Melanênese.
- e) Melena.

11. Um homem vítima de incêndio chega ao PA com queimaduras em tórax posterior e todo o membro superior e inferior esquerdo. Considerando a "regra dos nove", o percentual da superfície corporal atingida é de:

- a) 36%.
- b) 45%.
- c) 70%.
- d) 72%.
- e) 64%.

12. Um paciente politraumatizado por acidente automobilístico apresenta perda de sensibilidade, motilidade e atividade muscular dos membros inferiores. Esse quadro pode ser caracterizado como:

- a) Hemiparesia.
- b) Parestesia.
- c) Semiplegia.
- d) Paraplegia.
- e) Hemiplegia.

13. Das alternativas abaixo, qual não representa fator de risco para doença coronariana?

- a) Tabagismo.
- b) Sedentarismo.
- c) Hipertensão arterial.
- d) Hipercolesterolemia.
- e) Úlcera péptica.

14. Você está de plantão na sala de Classificação de Risco e tem a responsabilidade de priorizar o atendimento de acordo com a gravidade de cada caso.

De acordo com os sinais e sintomas descritos nas assertivas abaixo, preencha suas lacunas com números de 1 a 3, considerando 1 para alta prioridade, 2 para média prioridade e 3 para baixa prioridade.

() Indivíduo de 46 anos, hipertenso, dor precordial de início súbito, com irradiação para MSE e mandíbula, sudorético e pálido.

() Criança com hipertermia há três dias, sem febre no momento. Está ativa, sem sinais de desidratação.

() Paciente com 23 anos, dor lombar de início súbito com irradiação para região inguinal. Sem febre. Fácies de dor. Relata ainda náuseas e vômitos.

() Mulher idosa com 80 anos em tratamento regular na UBS. Diabética. HGT 125mg/dl no momento. Apresenta-se com queixa de fraqueza e inapetência há 6 semanas. Sinais vitais estáveis.

A seqüência que indica corretamente a respectiva prioridade de atendimento está na alternativa:

- a) 2-2-3-1.
- b) 1-3-2-1.
- c) 3-3-2-1.
- d) 2-1-3-1.
- e) 1-3-2-3.

15. Como se denomina a presença de sangue na urina?

- a) Epistaxe.
- b) Melena.
- c) Hematúria.
- d) Hemoptise.
- e) Enterorragia.

16. Quando prescrevemos rodízio dos locais de aplicação da insulina em pacientes diabéticos, estamos fazendo prevenção de uma possível:

- a) Hipoglicemia.
- b) Isquemia.
- c) Lipodistrofia.
- d) Microangiopatia.
- e) Cetoacidose.

17. Assinale a alternativa que **não** representa uma causa da DBPOC (Doença Bronco Pulmonar Obstrutiva Crônica).

- a) Fumo.
- b) Alergia.
- c) Infecção.
- d) Exposição profissional.
- e) Hereditariedade.

18. A perda súbita das funções cerebrais advinda de uma interrupção momentânea do fluxo sanguíneo cerebral em um indivíduo com diagnóstico prévio de hipertensão arterial é denominada:

- a) Isquemia.
- b) Trombose.
- c) Embolia.
- d) Hipertrofia.
- e) Hemorragia.

19. Assinale a alternativa que indica corretamente sinais e sintomas da Meningite Meningocócica.

- a) Constipação intestinal, vômito, febre e dor abdominal.
- b) Febre, cefaléia intensa, náuseas e vômitos
- c) Dor abdominal, febre, diarreia e dor torácica.
- d) Dor torácica, epistaxe, febre e náuseas.
- e) Dor na nuca, febre, diarreia e convulsões.

20. Em que posição devemos colocar a cabeça de um paciente em parada cardiorrespiratória quando da aplicação das manobras de ressuscitação?

- a) Inclinação.
- b) Lateralizada para direita.
- c) Flexionada.
- d) Hiperestendida.
- e) Lateralizada para a esquerda.