

Demonstrativo das vacinas disponibilizadas na Campanha Nacional de Multivacinação conforme esquema vacinal, Brasil, 2015.

Vacinas	Esquema vacinal
BCG	Dose única ao nascer. Para criança não vacinada menor de 5 anos de idade, conforme normas do PNI.
Hepatite B	Administrar a 1ª dose em toda criança até 1 mês de idade não vacinada. Para a criança maior de 1 mês de idade não vacinada, agendar a vacina pentavalente para os 2 meses idade.
Penta	Criança de 2 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias) deverá iniciar e concluir o esquema básico com esta vacina. <ul style="list-style-type: none">➤ 1ª dose aos 2 meses➤ 2ª dose aos 4 meses➤ 3ª dose aos 6 meses
Rotavírus	1ª dose aos 2 meses de idade. 2ª dose aos 4 meses de idade. Criança com idade de 1 mês e 15 dias a 3 meses e 15 dias pode receber a 1ª dose. Criança com idade de 3 meses e 15 dias a 7 meses e 29 dias pode receber a 2ª dose desta vacina.

Vacinas	Esquema vacinal
Pneumocócica 10 valente	<p>Criança a partir dos 2 meses de idade, deve receber 3 doses desta vacina com intervalo de 2 meses entre elas, e uma dose de reforço, preferencialmente entre 12 e 15 meses de idade.</p> <p>Criança entre 7 meses e 9 meses de idade não vacinada deve receber 2 doses desta vacina com intervalo de pelo menos 2 meses entre as doses e uma dose de reforço, preferencialmente entre 12 e 15 meses de idade.</p> <p>Criança entre 10 meses e 11 meses de idade não vacinada deve receber 1 dose desta vacina e uma dose de reforço, preferencialmente entre 12 e 15 meses de idade.</p> <p>Criança entre 1 ano e menor de 2 anos de idade (1 ano, 11 meses e 29 dias) não vacinada deve receber uma única dose desta vacina.</p>
Meningocócica C conjugada	<p>Criança a partir dos 3 meses de idade, deve receber 2 doses desta vacina com intervalo de 2 meses entre elas, e uma dose de reforço, preferencialmente entre 12 e 15 meses de idade.</p> <p>Criança entre 10 e 11 meses de idade, deve receber uma dose desta vacina e uma dose de reforço preferencialmente entre 12 e 15 meses de idade.</p> <p>Criança entre 1 ano a menor de 2 anos de idade (1 ano, 11 meses e 29 dias) não vacinada deve receber uma única dose desta vacina.</p>
Febre amarela	<p>Criança deve receber uma dose desta vacina aos 9 meses de idade e um reforço aos 4 anos, de acordo com a área de recomendação.</p> <p>Crianças indígenas devem receber uma dose desta vacina aos 9 meses de idade e um reforço aos 4 anos, independente da área onde residem.</p>

Vacinas	Esquema vacinal
Tríplice viral	<p>Criança deve receber a 1ª dose da vacina aos 12 meses de idade e agendar a 2ª dose para 15 meses de idade.</p> <p>Manter intervalo mínimo de 30 dias entre as doses para as crianças que chegarem aos serviços após 14 meses de idade.</p> <p>Criança maior de 15 meses de idade sem nenhuma dose deve receber a 1ª dose e agendar a 2ª dose obedecendo ao intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.</p>
Tetra viral ou tríplice + varicela (atenuada)	<p>Criança deverá receber 1 (uma) dose da vacina tetra viral aos 15 meses de idade até 1 ano, 11 meses, 29 dias. desde que já tenha recebido a primeira dose da vacina tríplice viral.</p> <p>Caso não esteja disponível a vacina tetra viral, administrar simultaneamente a 2ª dose de tríplice viral e uma dose de vacina varicela (atenuada), conforme Nota Informativa nº 66 de 2015/CGPNI/DEVIT/SVS/MS.</p>
DTP	<p>Criança deve receber o 1º reforço da vacina aos 15 meses de idade e agendar o 2º reforço para 4 anos de idade.</p> <p>Criança maior de 15 meses e menor que quatro anos, sem reforço desta vacina deve receber o 1º reforço, e agendar o 2º reforço para os 4 anos de idade, obedecendo o intervalo mínimo de 6 meses entre os reforços.</p> <p>Criança com 4 anos sem nenhum reforço administrar o um único reforço.</p>
Hepatite A	<p>Criança deve receber uma dose aos 12 meses de idade. A idade máxima para administração é 1 ano, 11 meses, 29 dias.</p>