# **Dormideira** Sibynomorphus turgidus

- Alimentam-se de lesmas ou caracóis;
  Não são peçonhentas, são extremamente dóceis, tendo como defesa a descarga cloacal;
- Apresentam porte pequeno, não ultrapassando de 50cm;
- Possui hábito noturno;
- habita plantações de cana-de-açúcar e locais próximos a água;
  - A fêmea põe sete ovos.

### **Dormideira** Sibynomorphus ventrimaculatus

- Alimenta-se de lesmas e caracóis;
  Não é peçonhenta. Muito dócil, sua defesa consiste em inflar a região gular, triangular a cabeça, lançar descargas cloacais e disparar botes falsos.
- Porte pequeno, atingindo 65cm;
- Habita campos e matas, porém não é incomum encontrálas no meio urbano;
- -Normalmente, encontrada enrodilhada, imóvel. Quando se movimenta, o faz de forma lenta.
- Possue atividade terrestre e noturna;
- A fêmea põe de quatro a cinco ovos.





Arthur Schramm de Oliveira

Animais protegidos pela Lei de Crimes Ambientais 9.605/98

# **REALIZAÇÃO:**

Programa de Conservação da Fauna Silvestre Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Fone: (51) 3289-7517

E-mail:

faunasilvestre@smam.prefpoa.com.br





# Saiba mais sobre as Serpentes

Podem ser terrestres, aquáticas, arborícolas, planadores e semi-aquáticas;

Existem mais de 3000 espécies;

São carnívoras, alimentam-se de pequenos animais (incluindo lagartos e outras cobras), aves, ovos e principalmente de ratos;

As serpentes não atacam seres humanos, a menos que estejam encurraladas, para se defender;

São animais de "sangue frio", seu corpo é coberto por escamas especializadas no ventre para se mover. Mudam sua pele periodicamente.

### COMO IDENTIFICÁ-LAS

Possuem cabeça arredondada, pouco destacada do corpo e com grandes escamas formando placas;

A pupila do olho é redonda;

Suas escamas são achatadas e lisas:

Não possuem dentes inoculadores de veneno;

Apresentam dentes pequenos e iguais;

Após a mordida, deixam vários furos pequenos e iquais;

Ausência de fosseta loreal:

# Falsa coral Oxyrhopus rhombifer

- Alimenta-se de antíbios, lagartos e pequenas aves e mamíferos;
- Porte médio, chegando a 90cm
- Serpente não peçonhenta; Apresenta-se muito dócil, tentando fugir quando são descobertas, raramente mordem;
- Utiliza descargas cloacais como comportamento defensivo:

- Padrão colorido tipicamente coral, o que as diferencia da coral-verdadeira (Micrurus altirostris) é a cor do ventre. sendo a sua branca, podendo apresentar pontuações escuras ou nearas.
- Habitam florestas e áreas abertas;
- São noturnas e terrestres;
- Não há registro de acidentes graves envolvendo esta
- Sua reprodução se dá entre agosto e setembro, desovas em dezembro e igneiro e nascimento entre fevereiro e abril:



#### Cobra-verde/ Cobra-Capim/ Cobra d'áaua

### Erythrolamprus poecilogyrus

- Alimenta-se principalmente de sapos, mas pode se alimentar de peixes, pequenos lagartos e roedores;
- Não é peçonhentas; são muito dócil;
  Sua defesa consta em fuga, descargas cloacais e achatamento dorsal;
- Pequeno porte, raramente chegando aos 90 cm;
- Sua coloração é verde, mas também pode haver exemplares de cor laranja, marrons e outras mais;
- Habita campos, proximidades de cursos d'água, banhados, acudes, arrojos e rios:
- A atividade é principalmente diurna, sendo mais intensa no início da manhã e no final da tarde, podendo ser encontrada o ano todo, inclusive no inverno;
- Sua reprodução acontece no mês de outubro, desova nos meses de novembro ou dezembro e o nascimento dos filhotes ocorrem em janeiro e fevereiro;



#### Cobra-verde/ cobra-cipó/ caninana-verde

### Chironius bicarinatus

- Alimenta-se de anfíbios, pequenos lagartos e pássaros.
- Não é peçonhentas;
- Quando avistada, procura fugir rapidamente para partes

altas das árvores, mas se capturada ou molestada, torna-se agressiva, desferindo vários botes.

- Tem como estratégia inflar a região da garganta, para tentar parecer um pouco maior e espantar quem atormenta:
- É uma serpente muito ágil e adaptada a vida arborícola;
- Pode passar de 1,7 de comprimento;
- Tem atividade diurna; vive sobre árvores, mas também desce ao solo.
- A fêmea pode por de cinco a 14 ovos.

### Cobra-verde/ Cobra-cipó

### Philodryas olfersii

- Alimenta-se de sapos, lagartos, aves e roedores;
- Semipeçonhenta;
- Espécie normalmente agressiva, lançando botes e mordendo, quando acuada. Existem registros de que não se mostrou incomoda com a presenca humana:
- Sua peçonha é considerada perigosa, havendo registros de óbitos causados por essa espécie;
- Não há soro antibotrópico específico para esta este gênero, sendo recomendado tratamento sintomático.
- Atividade diurna. Pode ser encontrada tanto em ambientes florestados como em áreas abertas e bordas de mata, deslocando-se no chão ou sobre a vegetação;
- Serpente de tamanho mediano, atingindo cerca de 1500 mm de comprimento total;
- Seu comportamento defensivo consiste basicamente em fugir rapidamente pelo chão ou sobre a vegetação, porém quando acuada ou capturada, morde com extrema agilidade, inoculando veneno.
- Alguns acidentes descritos na literatura indicam que a peçonha desta espécie é muito ativa, com forte ação local que geralmente causa extensos edemas.
- Fêmea põe de sete a oito ovos.

