



# Acidente com Servidor/Prestador PMPA e Terceirizado

## PROCEDIMENTO A SER ADOTADO NA UNIDADE



## Acidente com Servidor/Prestador PMPA e Terceirizado

### PROCEDIMENTO A SER ADOTADO NA UNIDADE



### ACOMPANHAMENTO DO ACIDENTADO

- Em até 7 dias comparecer na GSSM;
- Levar a NAT\*, Termo de Consentimento Informado do PACIENTE FONTE (se houver), Boletim de Atendimento e termo de Consentimento Informado do ACIDENTADO;
- Receber notificação quanto aos resultados dos exames realizados; solicitação de coleta de exames em 30, 90 e 180 dias.
- No caso de recusa em seguir o fluxo, encaminhar o termo de consentimento Pós-Informado (devidamente preenchido) juntamente com a NAT para EPM/GSSM

EPM/GSSM – Centro de Saúde IAPI - rua 03 de Abril, 90 (Área 15). Fone: 3341-6333 ramal 2321.

\*NAT – Notificação de Acidente de Trabalho

Considerando a importância da coleta e registro de dados referentes a acidentes de trabalho com servidores municipais, a ORDEM DE SERVIÇO Nº 018 de 09 de setembro de 1991, determina a implantação de formulário de notificação de acidente de trabalho, modelo C-164.

- **Acolhimento na GSSM:** Avaliar situação vacinal do acidentado. O acidentado deverá portar a carteira de acompanhamento.

Se não apresentar reação adversa ao ARV, agendar consulta médica em até 7 dias.

**OBS: Se trabalhador acidentado em uso de ARV apresentar reação adversa, exames alterados ou quadro clínico grave, encaminhar para o SAE ou Emergência.**

- **1º atendimento (7 dias após acidente):** Avaliar exames. Se paciente fonte ignorado ou HCV reagente, solicitar PCR\* (quantitativo/carga viral) que deverá ser realizado no 15º dia após o acidente.
- **2º atendimento (30 dias após o acidente):** dar seguimento à investigação – solicitar HbsAg, anti-HCV, anti-HIV e HTLV.
- **3º atendimento\*\* (90 dias após o acidente):** Solicitar anti-HIV, HBSAg, HTLV e PCR para HCV.
- **4º atendimento (180 dias após o acidente):** Solicitar Anti-HCV e HbsAg.
- **5º atendimento:** Avaliar exames e encerrar o acompanhamento.

\*Se PCR reagente encaminhar para o ambulatório das hepatites do HMIPV via AGHOS.

\*\*Encerrar a investigação do HIV se resultados negativos.