

Indicação da vacina HPV quadrivalente conforme as possíveis situações vacinais encontradas

Situações	Conduta	Orientações técnicas
(1) Se previamente recebeu D1 da vacina bivalente na clínica privada.	Deverá completar o esquema com a mesma vacina (bivalente) na clínica privada.	Não existem dados disponíveis sobre a segurança, imunogenicidade ou eficácia das duas vacinas contra o HPV quando usadas de forma intercambiável. Essas vacinas têm características, componentes e indicações diferentes, e em situações onde ambas são comercializadas, todos os esforços devem ser para a administração da mesma vacina para completar o esquema vacinal.
(2) Adolescente que previamente iniciou o esquema com a vacina quadrivalente na clínica particular.	Esta adolescentes poderá completar o esquema na rede pública. Conforme exemplos abaixo.	<p>Esquema reduzido: Intervalo recomendado 0 meses, 2 meses e 6 meses</p> <p>Intervalo mínimo * Entre D1 e D2: 4 semanas (1mês) Entre D2 e D3: 12 semanas (3 meses) Entre D1 e D3: 24 semanas (6 meses) Atenção especial entre as D1 e D3 mínimo de 6 meses</p>
(3) Se previamente recebeu D1 da vacina quadrivalente na clínica privada.	Administrar D2 com a vacina quadrivalente, respeitando o intervalo recomendado de 60 dias entre D1 e D2 intervalo mínimo de 30 dias. Agendar D3 da quadrivalente para 5 anos após D1, conforme esquema estendido. Caso a adolescente solicite, também é possível agendar D3 para pelo menos 3 meses após a D2 e 6 meses após a D1, respeitando o limite de até duas doses na rede pública no intervalo de um ano.	
(4) Se previamente recebeu a D1 da vacina quadrivalente e, por opção, receba a D2 em clínica privada para seguir o esquema 0, 2 e 6 meses.	Administrar D3 da vacina quadrivalente respeitando o intervalo recomendado de 4 meses entre a D2 e D3 (intervalo mínimo de 3 meses) e o mínimo de 6 meses entre a D1 e D3.	
(5) Se previamente recebeu D1 e D2 da vacina quadrivalente na clínica privada e, por opção, queira receber a D3 conforme o esquema 0, 2 e 6 meses.	Administrar D3 com a vacina quadrivalente, respeitando o intervalo de 6 meses entre a D1 e a D3.	
(6) Se referiu ter recebido previamente a vacina contra HPV, mas desconhece o tipo e não tem o comprovante.	Desconsiderar as doses anteriores e iniciar o esquema na rede pública com a vacina quadrivalente, administrar D1 e agendar D2 para seis meses depois.	
(7) Se recebeu a D1 da vacina quadrivalente há mais de 6 meses.	Administrar D2 da vacina quadrivalente e agendar D3 conforme o esquema estendido (60 meses da primeira dose).	
(8) Se esquema completo da vacina bivalente .	Não revacinar com a quadrivalente.	
(9) Adolescente de até 11 anos 11 meses e 29 dias que não recebeu a D1 da vacina quadrivalente .	Administrar D1 da vacina quadrivalente e agendar D2.	
(10) Adolescente que já completou 14 anos e recebeu a D1 da vacina quadrivalente .	Administrar a D2 e agendar a D3 60 meses após a D1.	
(11) Adolescente que já completou 14 anos e recebeu a D1 e D2 da vacina quadrivalente .	Agendar a D3 60 meses após a D1.	

Nota:

1. A mesma lógica deverá ser seguida para a população indígena.
2. A adolescente poderá tomar até duas doses na rede pública, no intervalo de até um ano.

Indicação da vacina HPV quadrivalente conforme as possíveis situações vacinais encontradas para meninas e mulheres vivendo com HIV (9 a 26 anos)

Situações	Conduta	Orientações técnicas
(1) Se previamente recebeu D1 da vacina bivalente na clínica particular.	Deverá completar o esquema com a mesma vacina (bivalente) na clínica privada.	Não existem dados disponíveis sobre a segurança, imunogenicidade ou eficácia das duas vacinas contra o HPV quando usadas de forma intercambiável. Essas vacinas têm características, componentes e indicações diferentes, e em situações onde ambas são comercializadas, todos os esforços devem ser para a administração da mesma vacina para completar o esquema vacinal.
(3) Se previamente recebeu D1 da vacina quadrivalente na clínica particular.	Administrar D2 com a vacina quadrivalente, respeitando o intervalo recomendado de 60 dias entre a D1 e D2, sendo o intervalo mínimo de 30 dias. Agendar D3 para pelo menos 3 meses após a D2 e 6 meses após a D1.	Esquema reduzido: Intervalo recomendado 0 meses, 2 meses e 6 meses Intervalo mínimo * Entre D1 e D2: 4 semanas (1 mês) Entre D2 e D3: 12 semanas (3 meses) Entre D1 e D3: 24 semanas (6 meses) Atenção especial entre as D1 e D3 mínimo de 6 meses
(4) Se recebeu a D1 da vacina quadrivalente e, por opção, queira receber a D2 em clínica particular.	Administrar D3 com a vacina quadrivalente, respeitando o intervalo de 6 meses entre a 1ª e a 3ª dose e o intervalo recomendado de 4 meses entre a 2ª e 3ª dose.	
(5) Se previamente recebeu D1 e D2 da vacina quadrivalente na clínica particular.	Administrar D3 com a vacina quadrivalente, respeitando o intervalo de 6 meses entre a 1ª e a 3ª dose e o intervalo recomendado de 4 meses entre a 2ª e 3ª dose.	
(6) Se referiu ter recebido previamente a vacina contra HPV, mas desconhece o tipo e não tem o comprovante.	Desconsiderar as doses anteriores e iniciar o esquema na rede pública com a vacina quadrivalente, administrar D1 e agendar D2 para 2 meses depois.	
(7) Se recebeu a D1 da vacina quadrivalente há mais de 6 meses.	Administrar D2 da vacina quadrivalente e agendar D3 respeitando o intervalo mínimo de 90 dias entre a 2ª e 3ª dose.	
(8) Se esquema completo da vacina bivalente .	Não revacinar com a quadrivalente.	
(9) Mulheres que já completaram 27 anos em 2015 e receberam a D1 da vacina quadrivalente .	Administrar a D2 com intervalo mínimo de 30 dias após D1 e agendar a D3 pelo menos 3 meses após D2 6 meses após a D1.	
(10) Mulheres que já completaram 27 anos em 2015 e receberam a D1 e D2 da vacina quadrivalente .	Agendar a D3 6 meses após a D1 e pelo menos 3 meses após D2.	

Nota:

1. A mesma lógica deverá ser seguida para a população indígena.
2. A adolescente poderá tomar até duas doses na rede pública, no intervalo de até um ano.